

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12 / 08 / 2014

[Signature]

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa: Berberin clorid 100mg; Tá dược vđ 1 viên nang cứng.
CHỈ ĐỊNH: Điều trị các trường hợp: Lý trực khuẩn, hội chứng lý. Lý amíp. Viêm ruột, tiêu chảy.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH và các thông tin khác: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
Nên uống một lần vào buổi sáng trước bữa ăn, một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ.
- Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: Uống 1-2 viên / lần, ngày 2 lần.
- Trẻ em: Từ 5 - 15 tuổi: Uống 1 viên / lần, ngày 2 lần.

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

Berzencin

- LÝ TRỰC KHUẨN, HỘI CHỨNG LÝ
- LÝ AMÍP
- VIÊM RUỘT, TIÊU CHẢY.



HATAPHAR

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS.
**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

SĐK:
Sản xuất tại:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

Berzencin

- LÝ TRỰC KHUẨN, HỘI CHỨNG LÝ
- LÝ AMÍP
- VIÊM RUỘT, TIÊU CHẢY.



HATAPHAR



Viên nang cứng

Berzencin

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa:
Berberin clorid 100mg; Tá dược vđ 1 viên nang cứng.
CHỈ ĐỊNH:
Điều trị các trường hợp: Lý trực khuẩn, hội chứng lý.
Lý amíp. Viêm ruột, tiêu chảy.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
Nên uống một lần vào buổi sáng trước bữa ăn,
một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ.
- Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: Uống 1-2 viên / lần,
ngày 2 lần.
- Trẻ em: Từ 5 - 15 tuổi: Uống 1 viên / lần, ngày 2 lần.
SĐK:

HATAPHAR

Số lô SX: HD:

Berzencin
- LÝ TRỰC KHUẨN, HỘI CHỨNG LÝ
- LÝ AMÍP
- VIÊM RUỘT, TIÊU CHẢY.



Hướng dẫn sử dụng thuốc:

BERZENCIN

- **Dạng thuốc:** Viên nang cứng.

- **Qui cách đóng gói:** Hộp 03 vỉ x 10 viên nang cứng

- **Công thức bào chế cho 1 đơn vị (1 viên) thành phẩm:** Mỗi viên nang cứng chứa:

Berberin clorid

100mg

Tá dược vđ

1 viên

(Tá dược gồm: Tinh bột sắn, lactose, gelatin, microcrystalline cellulose, natri lauryl sulfat, amidon, tartrazin).

- **Chỉ định:** Điều trị các trường hợp

+ Lỵ trực khuẩn, hội chứng lỵ.

+ Lỵ amíp.

+ Viêm ruột, tiêu chảy.

- **Cách dùng và liều dùng:** Nên uống một lần vào buổi sáng trước bữa ăn, và một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ.

- Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi : uống 1-2 viên / lần, ngày 2 lần.

- Trẻ em : Từ 5 – 15 tuổi : uống 1 viên / lần, ngày 2 lần.

Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

- **Chống chỉ định:** Quá mẫn với các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai.

- **Thận trọng:** Thận trọng với những người bị rối loạn tiêu hóa, trường bụng, đầy hơi.

- **Tác dụng không mong muốn:** Thuốc có thể gây táo bón khi dùng liều cao, kéo dài. Tác dụng này sẽ hết khi ngừng thuốc.

- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ, do đó sử dụng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

- **Tương tác thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.

- **Quá liều và xử trí:** Sử dụng quá liều sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu chất dinh dưỡng, làm cho tiêu hóa kém đi. Cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Xử trí: Ngừng dùng thuốc và tham vấn ý kiến của thầy thuốc.

- **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

* **Lưu ý:** Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng. Khi thuốc có biểu hiện biến màu, viên thuốc ẩm, mốc, mờ nhãn...hoặc có biểu hiện nghi ngờ khác phải hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

-**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

-**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thuốc sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khê - Hà Đông - TP Hà Nội

ĐT: 0433. 522203- 33516101 FAX: 0433522203

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Bá Lai