

105x50x44 (mm)

- M5, Y30
- M20, Y50
- M30, Y100
- M, Y100



KYONGDO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Kang Tae Won / President

[Composition] Trimebutine maleate 100mg
[Indications]
Please see the insert paper.
[Dosage & Administration]
Please see the insert paper.
[Precautions & Contraindications]
Please see the insert paper.

[Quality Specification]
Manufacturer's specification.
[Storage]
Store in tight containers at temperature below 30°C, protect from moisture and sunlight.
[Shelf-life]
36 months from manufacturing date.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USING

Lần đầu: 17.12.15
ĐÀ PHÊ DUYỆT
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
BỘ Y TẾ

MS792
BS1



WONCHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Kang Tae Won / President

BIMETIN Tablet
Trimebutine maleate 100mg
 THERAGEN ETEX CO., LTD. Korea

Visa No. :

Lot No. :

Mfg. Date :

Exp. Date :

Handwritten signature



R, THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Tờ hướng dẫn sử dụng

BIMETIN tablet

(Trimebutin maleat)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.

Tên thuốc: BIMETIN tablet.

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Hoạt chất:

Trimebutin maleat 100 mg

Tá dược: lactose, tinh bột ngô, light anhydrous silicic acid, low substituted hydroxypropyl cellulose, polyvinyl pyrrolidon K 30, magnesi stearat.

Dạng bào chế: Viên nén.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vi x 10 viên.

Đặc tính dược lực học

Trimebutin là thuốc dùng trong điều trị rối loạn dạ dày – ruột, có tác dụng chọn lọc trên hệ thần kinh dạ dày ruột (đám rối meissener, auerbach) cần thiết cho việc điều hòa nhu động dạ dày ruột, ngoài ra còn kích thích nhu động dạ dày – ruột có hiệu quả trong việc điều trị các rối loạn khác như hội chứng ruột kích thích.

Dược động học

Trimebutin maleat được hấp thu tốt bằng đường uống, đạt nồng độ tối đa trong máu sau khi uống từ 1 đến 2 giờ. Trimebutin maleat được đào thải nhanh chủ yếu qua nước tiểu: trung bình 70% sau 24 giờ.

Thuốc chỉ dùng khi có sự kê đơn của Bác sĩ.

Chỉ định:

Điều trị triệu chứng đau do rối loạn chức năng ống tiêu hóa. Điều trị và làm giảm các triệu chứng do hội chứng kích thích ruột.

Phẫu thuật ống tiêu hóa: Dùng trong chứng tắc liệt ruột sau giải phẫu để tăng cường hồi phục hoạt động của ruột sau phẫu thuật ổ bụng.

Liều lượng:

Uống 1-2 viên x 3 lần /ngày. Uống trước bữa ăn.

Liều lượng có thể tăng hoặc giảm theo tuổi và triệu chứng bệnh.


Chống chỉ định

Người quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Thận trọng

- Không dùng quá liều chỉ định.
- Không có dấu hiệu tiến triển sau một tháng điều trị, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.


Kang Tae Won / President

- Trẻ em uống thuốc cần có sự theo dõi của người lớn. Đối với trẻ nhỏ hơn 3 tháng tuổi thì cần có ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ.

- Sử dụng thuốc cần thận đối với những bệnh nhân sau (nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng thuốc):

Bệnh nhân đang được điều trị bởi bác sĩ.

Phụ nữ mang thai và cho con bú.

Tác dụng phụ

- Hệ tiêu hóa: Hiếm khi bị tiêu chảy, táo bón, buồn nôn, nôn, khô miệng.

- Hệ tim mạch: Thỉnh thoảng bị nhịp tim nhanh.

- Hệ thần kinh chức năng: Thường có mệt mỏi, chóng mặt, buồn ngủ, nhức đầu.

- Gan: Hiếm khi tăng giá trị GOT và GPT.

- Tăng cảm: Đôi khi có phát ban. Cần ngưng sử dụng thuốc ngay.

Thông báo ngay cho bác sĩ khi gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.

Tương tác với thuốc khác:

Chưa có thông tin

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

- Thời kỳ mang thai:

Vì chưa có nghiên cứu cụ thể về mức độ an toàn của thuốc trên phụ nữ mang thai nên chỉ dùng thuốc trong thời kỳ có thai khi thực sự cần thiết.

- Thời kỳ cho con bú: Không nên chỉ định thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. Chỉ nên sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú nếu thật sự cần thiết.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Một số tác dụng phụ của thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Do đó cần thận trọng đối với các đối tượng này.

Quá liều và cách xử trí

Chưa có báo cáo về việc sử dụng thuốc quá liều.

Trong trường hợp uống quá liều, cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm và tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TÀM TAY TRẺ EM.

Nhà sản xuất

THERAGEN ETEX CO., LTD.

58, Sandan-ro 68beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.



TUQ. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng

KYONGBIO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Kang Tae Won
Kang Tae Won / President