

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/08/2014

NHÃN VỈ C 500 GLOMED

Kích thước:

Dài :: 94 mm

Cao : 58 mm



Ngày 18 tháng 12 năm 2013
P. Tổng Giám Đốc




Trần Cẩm Tú

NHÃN CHAI C 500 GLOMED (chai 100 viên)

Kích thước:

Dài : 150 mm

Cao : 58 mm

COMPOSITION: Each capsule contains: Ascorbic acid (Vitamin C) 500 mg. INDICATIONS: For the treatment of deficiency of ascorbic acid leading to the development of a well-defined syndrome known as scurvy. For prevention flu, enhancement wound healing. DOSAGE AND ADMINISTRATION: 1-2 capsules daily or as directed by a physician. Swallow whole capsule with a glass of water. CONTRAINDICATIONS: Do not use this product in individuals with hypersensitivity to any ingredient of this product. Do not exceed indicated dosage in patients with deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), history of renal calculus, hyperoxaluria, oxalosis, thalassemia. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE. STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry place, protect from light. SPECIFICATION: Manufacturer's. Số Lô SX / Batch No.: NSX / Mfg. Date : HD / Exp. Date :	 Chai 100 viên nang cứng capsules  Acid ascorbic ACID ASCORBIC (VITAMIN C) 500 MG	THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa: Acid ascorbic (Vitamin C) 500 mg. CHỈ ĐỊNH: Điều trị bệnh do thiếu vitamin C (bệnh Scurbut). Phòng cúm, giúp mau lành vết thương. LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Từ 1 đến 2 viên mỗi ngày hoặc theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Uống nguyên viên thuốc với nước. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng thuốc trên người quá mẫn với các thành phần của thuốc. Không dùng liều cao cho người bị thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase (G6PD), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu, loạn chuyển hóa oxalat, bệnh thalassemia. ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. TIÊU CHUẨN: TCCS SDK / Reg. No.: Sản xuất bởi / Manufactured by: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương.
---	--	---

Ngày 18 tháng 12 năm 2013

P. Tổng Giám Đốc



Trương Cẩm Tú

NHÃN CHAI C 500 GLOMED (chai 200 viên)

Kích thước:

Dài : 190 mm

Cao : 75 mm



Chai 200 viên nang cứng
Bottle 200 capsules



Acid ascorbic

ACID ASCORBIC (VITAMIN C) 500 MG

COMPOSITION: Each capsule contains:
Ascorbic acid (Vitamin C) 500 mg.

INDICATIONS:
For the treatment of deficiency of ascorbic acid leading to the development of a well-defined syndrome known as scurvy. For prevention flu, enhancement wound healing.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: 1-2 capsules daily or as directed by a physician. Swallow whole capsule with a glass of water.

CONTRAINDICATIONS: Do not use this product in individuals with hypersensitivity to any ingredient of this product. Do not exceed indicated dosage in patients with deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), history of renal calculus, hyperoxaluria, oxalosis, thalassemia.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.

STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry place, protect from light.

SPECIFICATION: Manufacturer's.

Số Lô SX / Batch No.:
NSX / Mfg. Date :
HD / Exp. Date :

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa:
Acid ascorbic (Vitamin C) 500 mg.

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C (bệnh Scurbut).
Phòng cúm, giúp mau lành vết thương.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Từ 1 đến 2 viên mỗi ngày hoặc theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Uống nguyên viên thuốc với nước.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng thuốc trên người quá mẫn với các thành phần của thuốc.
Không dùng liều cao cho người bị thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase (G6PD), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu, loạn chuyển hóa oxalat, bệnh thalassemia.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS **SDK / Reg. No.:**
Thuốc dùng cho bệnh viện

Sản xuất bởi / Manufactured by:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore,
Thuận An, Bình Dương.

Ngày 18 tháng 12 năm 2013

P. Tổng Giám Đốc



Trang Cẩm Tú

NHÃN HỘP C 500 GLOMED (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Kích thước:

Dài : 90 mm

Rộng: 61 mm

Cao : 96 mm

COMPOSITION: Each capsule contains Ascorbic acid (Vitamin C) 500 mg. INDICATIONS: For the treatment of deficiency of ascorbic acid leading to the development of a well-defined syndrome known as scurvy. For prevention flu, enhancement wound healing. DOSAGE AND ADMINISTRATION: 1-2 capsules daily or as directed by a physician. Swallow whole capsule with a glass of water. CONTRAINDICATIONS: Do not use this product in individuals with hypersensitivity to any ingredient of this product. Do not exceed indicated dosage in patients with deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), history of renal calculus, hyperoxaluria, oxalosis, thalassemia. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE. STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry place, protect from light. SPECIFICATION: Manufacturer's. REG. No.:	Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng  Acid ascorbic	THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa Acid ascorbic (Vitamin C) 500 mg. CHỈ ĐỊNH: Điều trị bệnh do thiếu vitamin C (bệnh Scurvy). Phòng cúm, giúp mau lành vết thương. LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Từ 1 đến 2 viên mỗi ngày hoặc theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Uống nguyên viên thuốc với nước. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng thuốc trên người quá mẫn với các thành phần của thuốc. Không dùng liều cao cho người bị thiếu hụt glucose - 6 - phosphate dehydrogenase (G6PD), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu, loạn chuyển hóa oxalat, bệnh thalassemia. ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. TIÊU CHUẨN: TCCS. SĐK:	Box of 10 blisters x 10 capsules  Ascorbic acid
Manufactured by: GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc. 35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuận An, Bình Dương.	MỖI VIÊN NANG CỨNG CHỨA: ACID ASCORBIC (VITAMIN C) 500 MG Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.		EACH CAPSULE CONTAINS: ASCORBIC ACID (VITAMIN C) 500 MG

Số lô SX / Batch No.:
NSX / Mfg. Date :
HD / Exp. Date :

Ngày 18 tháng 12 năm 2013
P. Tổng Giám Đốc



Trang Cẩm Tú

NHÃN HỘP C 500 GLOMED (Hộp 1 chai x 100 viên)

Kích thước:

Dài : 54 mm

Rộng: 54 mm

Cao : 92 mm



Ngày 18 tháng 12 năm 2013
P. Tổng Giám Đốc



Trang Cẩm Tú

NHÃN HỘP C 500 GLOMED (Hộp 1 chai x 200 viên)

Kích thước:

Dài : 66 mm

Rộng: 66 mm

Cao : 135 mm

COMPOSITION:

Each capsule contains:
Ascorbic acid (Vitamin C) 500 mg

INDICATIONS:

For the treatment of deficiency of ascorbic acid leading to the development of a well-defined syndrome known as scurvy.
For prevention flu, enhancement wound healing.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

1-2 capsules daily or as directed by a physician.
Swallow whole capsule with a glass of water.

CONTRAINDICATIONS:

Do not use this product in individuals with hypersensitivity to any ingredient of this product.
Do not exceed indicated dosage in patients with deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), history of renal calculus, hyperoxaluria, oxalosis, thalassemia.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.


STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry place, protect from light.

SPECIFICATION: Manufacturer's.

REG. No.:



12



Hộp 1 chai x 200 viên nang cứng

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang cứng chứa:
Acid ascorbic (Vitamin C) 500 mg

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị bệnh do thiếu vitamin C (bệnh Scorbut).
Phòng cúm, giúp mau lành vết thương.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Từ 1 đến 2 viên mỗi ngày
hoặc theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
Uống nguyên viên thuốc với nước.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc trên người quá mẫn với các thành phần của thuốc.
Không dùng liều cao cho người bị thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase (G6PD), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu, loạn chuyển hóa oxalat, bệnh thalassemia.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SĐK:

Thuốc dùng cho bệnh viện



Box of 1 bottle x 200 capsules

Manufactured by:
GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.
35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park
Thuận An, Bình Dương

MỖI VIÊN NANG CỨNG CHỨA
ACID ASCORBIC (VITAMIN C) 500 MG

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore,
Thuận An, Bình Dương.

EACH CAPSULE CONTAINS
ASCORBIC ACID (VITAMIN C) 500 MG

Số lô SX / Batch No.:

NSX / Mfg. Date :

HD / Exp. Date :

Ngày 18 tháng 12 năm 2013

P. Tổng Giám Đốc



Trang Cẩm Tú

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

C 500 GLOMED

Acid ascorbic

Viên nang cứng

1. Thành phần

Mỗi viên nang cứng chứa:


Hoạt chất: Acid ascorbic (Vitamin C) 500 mg

Tá dược: Natri metabisulfit, magnesi stearat.

2. Mô tả sản phẩm

C 500 GLOMED được bào chế dưới dạng viên nang dùng để uống chứa acid ascorbic. Đây là viên nang cứng số 0, một đầu màu cam, một đầu màu vàng, có in chữ GLM, bên trong chứa bột thuốc màu trắng ngà.

Acid ascorbic, (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-on, là một vitamin tan trong nước. Công thức phân tử là $C_6H_8O_6$, và phân tử lượng là 176,12. Công thức cấu tạo:



Mỗi viên nang cứng chứa 500 mg acid ascorbic.

3. Cơ chế tác dụng

Acid ascorbic (vitamin C), một vitamin tan trong nước, có vai trò thiết yếu cho sự tổng hợp collagen, chất gian bào và nhiều quá trình chuyển hóa khác nhau bao gồm sự biến đổi acid folic thành acid folinic và chuyển hóa sắt.

4. Chỉ định

Điều trị bệnh do thiếu vitamin C (bệnh Scurbut).

Phòng cúm, giúp mau lành vết thương.

5. Liều dùng và cách dùng

Uống 1-2 viên mỗi ngày hoặc theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

Nuốt nguyên viên thuốc với nước.

6. Chống chỉ định

Không dùng thuốc trên người quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Không dùng liều cao cho người bị thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase (G6PD), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu, loạn chuyển hóa oxalat, bệnh thalassemia.

7. Lưu ý và thận trọng

Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể gây nhờn thuốc, do đó sẽ dẫn đến thiếu hụt vitamin C khi giảm liều.

Tăng oxalat niệu và tạo sỏi calci oxalat ở thận khi dùng vitamin C liều cao. Do đó cần thận trọng khi dùng trên người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu, loạn chuyển hóa oxalat.

Người bị thiếu hụt G6PD dùng liều cao vitamin C có thể bị chứng tan máu.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Vitamin C thường được xem là an toàn trong thai kỳ nếu được uống theo liều khuyến dùng. Tuy nhiên, đã có báo cáo về bệnh Scurbut do dung nạp/đề kháng ở trẻ sơ sinh khi người mẹ dùng một lượng lớn vitamin C trong thai kỳ.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Vitamin C hiện diện trong sữa mẹ. Không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ khi người mẹ dùng vitamin C với liều khuyến dùng.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Acid ascorbic có thể gây nhức đầu và buồn ngủ, nên xác định sự nhạy cảm này trước khi dùng trong khi đang lái xe hoặc vận hành máy móc.

8. Tác dụng không mong muốn

Tăng oxalat - niệu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mất ngủ, và tình trạng buồn ngủ đã xảy ra. Sau khi uống liều 1g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thể xảy ra tiêu chảy.

Thường gặp, ADR > 1/100

Thận: Tăng oxalat niệu.

Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100

Máu: Thiếu máu tan máu.

Tim mạch: Bùng đỏ, suy tim.

Thần kinh trung ương: Chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi.

Dạ dày - ruột: Buồn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy.

Thần kinh - cơ và xương: Đau cạnh sườn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

9. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác

Dùng đồng thời với acid acetylsalicylic làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết acid acetylsalicylic trong nước tiểu.

Vitamin C làm giảm nồng độ fluphenazin trong huyết tương.

Dùng đồng thời trên 200 mg vitamin C và trên 30 mg sắt nguyên tố có thể làm tăng hấp thu sắt.

10. Quá liều và xử trí

Triệu chứng: Các triệu chứng quá liều vitamin C có thể gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và tiêu chảy nghiêm trọng.

Xử trí: Trong trường hợp ngộ độc do uống liều lớn vitamin C, truyền dịch và gây lợi tiểu mạnh có thể có tác dụng.

11. Dạng bào chế và đóng gói

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.

Hộp 1 chai x 100 viên nang cứng.

Hộp 1 chai x 200 viên nang cứng.

12. Điều kiện bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

13. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

14. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED**

Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3768822

Fax: 0650.3769095

Ngày 19 tháng 12 năm 2013

Tổng giám đốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng



Trang Cẩm Tú