

88/2138

✓

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT


Lần đầu: 13/01/2013

Hộp CADISMECTITE : (WxDxH) 75 x 62 x 102mm



CADISMECTITE

Thuốc bột uống Diosmectite 3000,00 mg



Handwritten signature

Thành phần

Mỗi gói chứa:

Diosmectite 3000,00 mg

Tá dược: Sachelac, Aspartam, Colloidal silicon dioxyd, Talc, Vanilin.

Phân loại: CADISMECTITE là thuốc hấp phụ và làm săn

Chỉ định

- Điều trị các chứng đau của viêm thực quản - dạ dày- tá tràng và đại tràng
- Ỉa chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn ỉa chảy kéo dài. Theo Tổ chức Y tế thế giới, diosmectit không có vị trí nào trong điều trị ỉa chảy cấp ở trẻ em và không nên dùng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Liều lượng và cách dùng

Trẻ em:

Dưới 1 tuổi ngày 1 gói chia 2-3 lần

Từ 1-2 tuổi ngày 1-2 gói chia 2-3 lần

Trên 2 tuổi ngày 2-3 gói chia 2-3 lần.

Hòa tan gói thuốc với khoảng 50ml nước, trước mỗi lần dùng thuốc cần lắc hoặc khuấy đều. Có thể thay nước bằng dịch thức ăn như nước canh, nước rau hoặc trộn kỹ với thức ăn nửa lỏng như món nghiền rau quả.

Người lớn:

Mỗi lần 1 gói, hòa vào nửa cốc nước ấm, khuấy đều rồi uống ngày 3 lần.

Trường hợp tiêu chảy cấp liều khởi đầu có thể gấp 2 lần.

Uống sau bữa ăn đối với người viêm thực quản.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác.

Riêng viêm loét trực tràng dùng cách thụt

Thụt trực tràng:

Mỗi lần 1-3 gói hòa với 50 đến 100 ml nước ấm, rồi thụt. Ngày 1-3 lần

Chống chỉ định

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Không dùng chữa ỉa chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em.

Thận trọng

Khi có sốt không dùng thuốc này quá 2 ngày. Nếu ỉa chảy mất nước cần bù nước kết hợp dùng thuốc bằng đường uống hoặc tiêm truyền dịch tĩnh mạch, số lượng nước cần bù tùy theo tuổi, cơ địa người bệnh và mức độ bị tiêu chảy. Cần thận trọng khi dùng diosmectit để điều trị ỉa chảy nặng, vì thuốc có thể làm thay đổi độ đặc của phân và chưa biết có ngăn được mất nước và điện giải còn tiếp tục trong ỉa chảy cấp.

Phụ nữ mang thai

Không có chống chỉ định với phụ nữ thời kỳ mang thai

Phụ nữ cho con bú

Không có chống chỉ định với phụ nữ thời kỳ cho con bú

Tương tác thuốc



Diosmectit có thể hấp phụ một số thuốc khác, do đó có thể ảnh hưởng đến thời gian và tỷ lệ hấp thu của các thuốc đó, nên uống các thuốc khác sau khi uống diosmectit khoảng 2-3 giờ.

Tác dụng phụ(ADR)

Rất hiếm trường hợp diosmectit gây táo bón hoặc làm nặng thêm mức độ táo bón đã có trước khi dùng thuốc.

Hướng dẫn xử trí ADR:

Cần giảm liều khi bị táo bón.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí

Triệu chứng: Dùng thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc ỉa chảy.

Xử trí: Cần ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng

Dạng trình bày

Hộp 20 gói x 3,8g

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô, mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng mặt trời.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất

Công Ty TNHH US Pharma USA

Lô B1 – 10, đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 38230108.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

