

1. Nhãn trên hộp:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/12/2013



2. Nhãn trên gói:

WHO GMP Gói 1,5 g

CETECO DAMUC
Acetyl cystein 100 mg



Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW 3
115 Ngõ Quai TV - quận Hải Châu
thành phố Đà Nẵng

CHỈ ĐỊNH:
Dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh nhày phổi, viêm phế quản cấp và mạn và làm sạch đường hô hấp trong mô khủ quết. Dùng làm thuốc giải độc trong quá liều paracetamol.

LIỀU DÙNG:
- Làm thuốc tiêu chất nhầy
- Trẻ em 2 - 6 tuổi: 200mg/ lần x 2 lần/ngày
- Người lớn: 200mg/ lần x 3 lần/ngày
- Làm thuốc giải độc quá liều paracetamol:
Liều đầu tiên: 140 mg/kg, dùng đúng dịch dạ, tiếp theo cách 4 giờ uống 1 lần, liều 70 mg/kg tiếp trong và uống tổng cộng 17 lần

CÁCH DÙNG: Hòa tan thuốc trong % ly nước

CHỨNG CHỈ BỊNH: TẮC DÙNG PHỤ
xem trong box hướng dẫn sử dụng

Để SA TÀI TÀI TẾ EM
DƯỢC SỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÁC DỤNG: 800 20 20
BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C
MỖI HỘ MẬT TRÊN HỘ SÁNG TRỰC TIẾP

Tên chuẩn: TCOS
Số lot SX: NSX



CETECO DAMUC
Acetyl cystein 100mg

THÀNH PHẦN:
Acetyl cystein 100mg
Tá dược vừa đủ 1 gói

CHỈ ĐỊNH: CHỐNG CHỈ ĐỊNH: CÁCH DÙNG: LIỀU DÙNG:
Xin đọc box hướng dẫn:
Dạng TCOS
SDV/Rec. No:

ĐƯỢC SỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÁC DỤNG: 800 20 20
BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C
MỖI HỘ MẬT TRÊN HỘ SÁNG TRỰC TIẾP

CETECO DAMUC
Acetyl cystein 100mg



Hộp 20 gói x 1,5 gram
WHO GMP

Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW 3
115 Ngõ Quai TV - quận Hải Châu
thành phố Đà Nẵng

CETECO DAMUC
Acetyl cystein 100mg

COMPOSITION:
Acetyl cystein 100mg
Excipient, q.s. 1 sachet

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE:
Read the leaflet inside

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ THE ACCOMPANYING LEAFLET.
STORE AT TEMPERATURES NOT EXCEEDING 30°C
KEEP IN A COOL, DRY PLACE, PROTECT FROM LIGHT



CETECO DAMUC
Acetyl cystein 100mg



Box of 20 sachets x 1.5 gram
WHO GMP

Manufactured by
CENTERPHARCO
115 Ngõ Quai TV - Hải Châu District
Da Nang city

MẪU NHÃN THUỐC

Tờ hướng dẫn sử dụng:

Thuốc bột CETECO DAMUC (gói 1,5g)

Thành phần:

Acetyl cystein 100 mg

Tá dược: Dextro anhydrous, aspartam, hương dâu, Erythrosin, Lactose vđ 1 gói.

Dược lực học: Là 1 chất amino - acid tự nhiên, Acetyl cystein làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mủ hoặc không bằng cách tách đôi cầu nối disulfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học. Acetyl cystein được dùng để chống gây độc cho gan do quá liều paracetamol bằng cách duy trì hoặc khôi phục nồng độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyển hoá trung gian của paracetamol gây độc cho gan.

Chỉ định:

- Dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh nhầy nhớt, bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh như trong viêm phế quản cấp và mạn và làm sạch đường quy trong mờ khí quản.
- Dùng làm thuốc giải độc trong quá liều paracetamol.

Liều dùng:

- Làm thuốc tiêu chất nhầy: + Trẻ em từ 2 - 6 tuổi: 200 mg x 2 lần/ngày.
+ Người lớn: 200 mg x 3 lần/ngày.
- Làm thuốc giải độc quá liều paracetamol: Liều đầu tiên 140mg/kg, dùng dung dịch 5%; tiếp theo cách 4 giờ uống 1 lần, liều 70mg/ kg thể trọng và uống tổng cộng 17 lần.

Chống chỉ định: Tiền sử hen. Người mẫn cảm với Acetyl cystein. Trẻ em dưới 2 tuổi.

Thận trọng: Phải giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng cho người bệnh có tiền sử dị ứng. Nếu có co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như salbutamol (thuốc beta - adrenergic chọn lọc, tác dụng ngắn) hoặc ipratropium (thuốc kháng muscarin) và phải ngừng acetylcystein ngay. Khi điều trị với acetylcystein có thể xuất hiện nhiều đờm loãng ở phế quản, cần phải hút để lấy ra nếu bệnh nhân giảm khả năng ho. **Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: thuốc dùng an toàn cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không có ảnh hưởng gì.

Tác động không mong muốn của thuốc:

- Buồn nôn, nôn.
- Buồn ngủ, nhức đầu, ù tai.
- Viêm miệng, chảy nước mũi nhiều.
- Phát ban, mề đay.
- Co thắt phế quản kèm phản ứng dạng phản vệ toàn thân, sốt, rét run (hiếm gặp)

Tương tác thuốc: Acetyl cystein là một chất khử nên không phù hợp với các chất oxy hoá. Không dùng đồng thời các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng Acetyl cystein.

Sử dụng quá liều: Có triệu chứng như triệu chứng phản vệ nhưng nặng hơn nhiều: Đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hấp, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận. Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị quá liều khi đang điều trị nhiễm độc paracetamol. Điều trị quá liều theo triệu chứng.

Bảo quản: Nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS: 0511 - A - 135 - 12

Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5 gam

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

Thuốc được sản xuất tại Công TNHH MTV Dược TW 3

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3822767



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW 3



Phạm Chi Oanh