



100/81



Compositions: Each tube contains
Hydrous Benzoyl Peroxide BP equivalent to Anhydrous
Benzoyl Peroxide BP 5% w/w
**Dosage, Administration, Indications, Contra-indications,
Precautions, Side-effects and other information:**
Refer to enclosed package insert
Storage: Store in a cool dry place, protect from light
Specifications: In-house
Keep out of reach of children.
Read carefully the package insert before use.

Manufactured by:
Zyg Pharma Pvt. Ltd.,
Plot No 810, Sector III, Industrial
Area, Pithampur Dist Dhar (M.P.), India



Thành phần: Mỗi tuýp gel bôi ngoài da có chứa
Hydrous Benzoyl Peroxide BP tương đương
Anhydrous Benzoyl Peroxide BP 5% w/w
**Liều lượng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định,
thận trọng, tác dụng ngoại ý và các thông tin khác:**
Xin xem tờ hướng dẫn bên trong hộp
Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất
Để thuốc xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Mfg. Lic. No.: 25/10/96
Visa No. (Số ĐK): VN-###-##
Batch No. (Số lô SX): ###
Mfd. Date (Ngày SX): dd/mm/yyyy
Exp. Date (Hạn dùng): dd/mm/yyyy

DNNK... Địa chỉ
Sản xuất bởi:
Zyg Pharma Pvt. Ltd.,
Plot No 810, Sector III, Industrial
Area, Pithampur Dist Dhar (M.P.), Ấn Độ.



R_x

ENZOXID 5 ANTIACNE GEL

CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT:

Thuốc bán theo đơn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Xin thông báo cho bác sĩ biết các tác dụng

không mong muốn xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc.

Đề thuốc xa tầm tay trẻ em.

Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

THÀNH PHẦN:

Dược chất:

Hydrous Benzoyl peroxide BP

tương đương với anhydrous Benzoyl Peroxide BP 5% w/w

Tá dược:

Carbomer 940, Edetic Acid, Polyoxyethylene Lauryl Ether (Brij 30), Sodium Hydroxide, Nước cất pha tiêm.

DƯỢC LỰC HỌC:

Benzoyl peroxide hoạt chất chính của Eclaran, là một tác nhân oxy hóa mạnh với các đặc tính chống mụn trứng cá.

Benzoyl peroxide có tác động diệt khuẩn đối với *Propionibacterium acnes* là tác nhân chính gây ra tình trạng viêm.

Benzoyl peroxide có tác động tiêu sừng và chống tiết bã nhờn vừa phải

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Thuốc hấp thu qua da khoảng 1,8 mcg/cm² hoặc 45% liều dùng trong khoảng 24 giờ. Lượng benzoyl peroxide được hấp thu sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành acid benzoic ở da

Benzoyl peroxide bôi tại chỗ khuếch tán chọn lọc đến các biểu bì sau đến từ từ vào đến lớp bì

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị mụn trứng cá thông thường

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng

Liều lượng nên được điều chỉnh theo các dấu hiệu lâm sàng, đáp ứng điều trị và dung nạp tại chỗ ở từng người.

- Liều thông thường: Thoa thuốc 1-2 lần/ngày.

- Liều duy trì: Thoa 1 lần/ngày

Rửa tay sau khi bôi thuốc

Cách dùng

Thuốc bôi ngoài da. Chỉ dùng thuốc trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:



Không dùng cho bệnh nhân quá mẫn với các thành phần của thuốc

CẢNH BÁO:

Lúc đầu có thể có cảm giác hơi bị kích ứng, điều này không phải là do không dung nạp hay dị ứng. Tuy nhiên vẫn nên thử độ nhạy cảm của da trước khi dùng thuốc (bôi nhiều lần lên một bề mặt da nhỏ trong nhiều ngày liên tục).

Để giảm đến mức tối thiểu hiện tượng bị kích ứng:

- Không bôi thuốc nếu những lần sử dụng trước đã bị kích ứng
- Ngoại trừ có những chỉ định cụ thể không nên dùng đồng thời với những thuốc bôi tại chỗ khác có tác dụng làm tiêu sừng hay tẩy màu.
- Nên làm vệ sinh da mỗi ngày 1-2 lần bằng các sản phẩm tẩy rửa chuyên biệt cho da, không dùng nước hoa hay các sản phẩm có chứa cồn.
- Tránh phơi nắng trong thời gian đầu điều trị, sau đó nếu có phơi nắng phải bôi kem chống nắng.
- Không nên sử dụng đèn chiếu tia tử ngoại
- Đặc biệt thận trọng khi bôi thuốc cho những người có màu da sáng hay khi bôi lên những vùng da nhạy cảm như cổ, ngực, quanh mắt, miệng.

Nếu tình trạng kích ứng có vẻ nặng hoặc không dung nạp thì nên giảm số lần bôi thuốc.

Nếu tình trạng ngứa vẫn kéo dài gây khó chịu nên ngừng bôi thuốc.

Nếu vô ý bôi thuốc lên niêm mạc (mắt, miệng, lỗ mũi) hay mí mắt cần rửa sạch với nhiều nước.

Không bôi thuốc lên vết thương chảy máu hay da bị tổn thương.

ẢNH HƯỞNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE HAY VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không thấy báo cáo liên quan.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Thận trọng khi dùng với các thuốc có tác dụng làm bong vảy

Không được dùng Benzoyl peroxide khi phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc tia tử ngoại.

Dùng đồng thời với thuốc chống nắng có chứa acid paraminobenzoic sẽ làm biến đổi màu da một thời gian

SỬ DỤNG TRÊN PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thời kỳ mang thai:

Còn chưa biết rõ benzoyl peroxide có gây tổn hại cho thai khi dùng cho người mang thai hoặc có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không. Tuy nhiên, chỉ nên dùng cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết. Chưa có tài liệu về tác dụng của benzoyl peroxide trên sự trưởng thành, phát triển và hoàn thiện các chức năng của thai nhi

Thời kỳ cho con bú:

Còn chưa biết thuốc này có bài tiết vào sữa mẹ hay không. Nên cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ đang cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Da nhạy cảm với ánh nắng



Hiện tượng kích ứng xảy ra nặng và kéo dài mặc dù đã làm đúng theo các hướng dẫn

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ KHI QUÁ LIỀU:

Nếu xảy ra tróc vảy da quá nhanh, ban đỏ hoặc phù cần ngưng dùng thuốc. Để khắc phục nhanh các tác dụng có hại có thể đắp gạc lạnh. Sau khi các triệu chứng và các biểu hiện trên đã giảm có thể dùng thử một cách thận trọng liều lượng thấp hơn nếu cho rằng phản ứng đã xảy ra là do dùng quá liều chứ không phải do dị ứng

BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

DẠNG BÀO CHẾ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 tuýp 20g Gel 5%

NHÀ SẢN XUẤT:

ZYG PHARMA PVT. LTD.,

Trụ sở: 405-408, Navbharat Estates, B Wing, 172, Zakharia Bunder Road,
Sewri (West), Mumbai - 400 015, India

Nhà máy: Plot No.810, Sector III. Industrial Area, Pithampur Dist Dhar (M.P.),
India

Ngày xem xét lại tờ hướng dẫn sử dụng: 20/12/2011



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

