

# MẪU NHÃN

<https://trungtamthuoc.com/>

1. Nhãn trên lọ 10 ml  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/12/2012  
2. Nhãn trên hộp giấy



Đà Nẵng ngày 18 tháng 05 năm 2011  
TỔNG GIÁM ĐỐC



CN. Nguyễn Thị Vạn Thọ

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC – ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**THUỐC NHỎ MẮT**

**Rx EPIDAREX**  
(THUỐC BÁN THEO ĐƠN)

**THÀNH PHẦN :** Mỗi lọ 10ml có chứa :

- Dexamethason natri phosphat ..... 11 mg
- Gentamicin base ..... 30 mg
- Tá dược (Na<sub>2</sub>EDTA, Natri clorid, Natri tetraborat, Acid boric, HPMC 4000, nước cất )  
vừa đủ..... 10 ml

**DƯỢC LỰC HỌC**

- Hiệu lực của EPIDAREX là do sự kết hợp giữa một kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid có tác dụng diệt khuẩn là Gentamicin với một chất kháng viêm steroid có hoạt tính cao là Dexamethason.
- EPIDAREX được bào chế với hệ tá dược thích hợp để đảm bảo hoạt tính ổn định, tác dụng nhanh và kéo dài. EPIDAREX không gây kích ứng với niêm mạc.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC**

- Trong vòng 10 đến 20 phút sau khi nhỏ 1 liều dexamethason vào mắt, thuốc này sẽ hiện diện với nồng độ cao ở kết mạc, giác mạc và tiền phòng.
- Hiện tại, chưa có số liệu về mức hấp thu vào toàn thân của gentamicin, dexamethason sau khi nhỏ mắt.

**CHỈ ĐỊNH :** Thuốc dùng theo đơn của thầy thuốc theo các chỉ định sau :

- Viêm kết mạc do nhiễm khuẩn
- Viêm giác mạc không tổn thương.
- Viêm mí mắt.
- Ngừa nhiễm khuẩn trước và sau khi phẫu thuật, nhiễm khuẩn do chấn thương.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH :**

- Người bị dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.
- Herpes giác mạc, chấn thương và lở loét giác mạc
- Bệnh nấm mắt.
- Glaucom góc đóng và góc mở.
- Bệnh lao mắt, nấm mắt.

**LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG :** Dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc theo liều trung bình sau:  
Nhỏ vào mắt 1-2 giọt/ lần. Ngày nhiều lần. Thời gian điều trị không quá 10 ngày.

**TÁC DỤNG NGOẠI Ý**

- Có thể gây kích thích tạm thời tại chỗ: Khó chịu, chảy nước mắt, nóng rát, sung huyết kết mạc.
- Có thể gây phản ứng nhạy cảm về da - kết mạc.
- Khi dùng lâu ngày: tăng nhãn áp do dùng corticoid, đục thủy tinh thể, viêm kết mạc bề mặt, mỏng lớp giác mạc, cườm.
- Trường hợp loét giác mạc hoặc cùng mạc, các chất corticoid có thể làm chậm sự lành sẹo và dễ gây bội nhiễm.

**Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

**TƯƠNG TÁC THUỐC**

- Tránh dùng phối hợp EPIDAREX với các loại thuốc tra mắt có chứa kháng sinh khác. Khi cần dùng nhiều thuốc tại chỗ cho mắt, nên dùng các thuốc cách nhau 5 phút.
- Nên thông báo cho Bác sĩ điều trị biết tất cả các liều thuốc đang sử dụng trước khi dùng bất cứ một loại thuốc nào khác.





