

R_x Prescription Drug 10 Blisters x 10 Tablets

ERETAB tablet
Eperisone HCl 50mg

BO Y TE
CUC QUAN LY THUOC

DA PHE DUYET

Lần đầu: 01/4/2013

Manufacturer: **HUTECS KOREA PHARMACEUTICAL CO., LTD.**
555-2, Yeongcheon-si, Dongtan-myeon, Hwasung-si, Gyeonggi-do, Korea

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao đường có chứa:
Eperisone HCl50mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG NGOẠI Ý VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng

TIÊU CHUẨN: Nhà sản xuất

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, ở nhiệt độ dưới 30°C

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số DK: Số M:
Ngày sc: HD:
DNNK:



R_x Thuốc kê toa III VI X III Viên

ERETAB tablet
Eperisone HCl 50mg

Sản xuất bởi:
HUTECS KOREA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
555-2, Yeongcheon-si, Dongtan-myeon, Hwasung-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

COMPOSITION:
Each sugar-coated tablet contains
Eperisone HCl50mg


INDICATION, CONTRAINDICATION, DOSAGE, ADMINISTRATION:
Please see the insert paper

PRECAUTION, SIDE EFFECT AND OTHER INFORMATION:
Please see the insert paper

SPECIFICATION: In house

STORAGE: store in tight container at temperature below 30°C, avoid humidity

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY INSERT PAPER BEFORE USE



President. Lee Sang Il

COMPOSITION:
Each sugar-coated tablet contains
Eperisone HCl50mg

INDICATION, CONTRAINDICATION, DOSAGE, ADMINISTRATION:
Please see the insert paper

PRECAUTION, SIDE EFFECT AND OTHER INFORMATION:
Please see the insert paper

STORAGE:
Store in tight container at temperature below 30°C, avoid humidity

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY INSERT PAPER BEFORE USE

DNNK:

R_x Thuốc kê toa

ERETAB tablet
Eperisone HCl 50mg
200 viên nén bao đường

HUTECS KOREA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
555-2, Yeongcheon-si, Dongtan-myeon, Hwasung-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén bao đường có chứa:
Eperisone HCl50mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG NGOẠI Ý VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng

BẢO QUẢN:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, nhiệt độ dưới 30°C

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số DK: Số M:
Ngày sc: HD:

Tờ hướng dẫn sử dụng

R, **THUỐC KÊ ĐƠN**

ERETAB

(Eperisone Hydrochloride)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.

[Tên thuốc] ERETAB

[Thành phần] Mỗi viên chứa :

Hoạt chất:

Eperisone Hydrochloride50mg

Tá dược: Lactose Hydrate, Corn Starch, Hydroxypropylcellulose, Sodium Carboxymethylstarch, Magnesium Stearate, Precipitated Calcium Carbonate, Gelatin, Sucrose, Talc, Titanium Oxide, Acacia, Carnauba Wax.

[Dạng bào chế] Viên nén bao đường.

[Quy cách đóng gói] 10 vỉ x 10 viên/hộp, lọ 200 viên

[Chỉ định]

Eretab được chỉ định làm giãn cơ xương trong các triệu chứng co thắt cơ và cơ cứng trong các bệnh sau: Liệt cột sống co cứng, thoái hóa đốt sống cổ, di chứng sau mổ (bao gồm: u não tủy), di chứng chấn thương (chấn thương cột sống, chấn thương đầu), xơ cứng teo cơ, liệt não, thoái hóa tiểu não, bệnh mạch máu cột sống.

Cải thiện các triệu chứng tăng trương lực cơ liên quan đến những bệnh sau: Hội chứng đốt sống cổ, viêm quanh khớp vai và thắt lưng.

Thuốc chỉ dùng khi có sự kê đơn của Bác sỹ.

[Liều lượng]

Thường dùng cho người lớn: uống 3 viên/ngày chia làm 3 lần sau bữa ăn.

[Chống chỉ định]

Thuốc được chống chỉ định ở bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

[Thận trọng]

- Thận trọng khi dùng cho những bệnh nhân sau:
 - Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với thuốc.
 - Bệnh nhân rối loạn chức năng gan.
- Thận trọng đặc biệt: các triệu chứng như mệt mỏi, nhẹ đầu, buồn ngủ hoặc các triệu chứng khác có thể xảy ra. Nếu gặp các triệu chứng đó phải giảm liều hoặc ngưng điều trị. Bệnh nhân cần được cảnh báo không có những hoạt động có thể gây nguy hiểm như vận hành máy móc hoặc lái xe.



[Tác dụng phụ]

Tác dụng phụ của thuốc rất hiếm gặp và chỉ thấy ở một số ít trường hợp. Các tác dụng phụ là: giãn cơ, đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, chán ăn, ngủ gà, ban da, tiêu chảy, khó tiêu, khó chịu ở dạ dày, mất ngủ, đau đầu, táo bón...

Thông báo ngay cho bác sĩ khi gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.

[Tương tác thuốc]

Dùng thuốc đồng thời với Methocarbamol có thể ảnh hưởng đến thính giác. Có một báo cáo đề cập đến tình trạng rối loạn điều tiết mắt khi dùng kết hợp Methocarbamol với Tolperisone Hydrochloride (Một chất có cấu trúc tương tự Eperisone Hydrochloride).

[Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú]

- Độ an toàn của việc dùng thuốc cho phụ nữ có thai chưa được xác lập. Thuốc được dùng cho phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai khi lợi ích của việc điều trị có giá trị hơn bất kỳ một nguy cơ nào có thể xảy ra.
- Thuốc được khuyến cáo không nên dùng cho phụ nữ cho con bú. Nếu bắt buộc phải dùng, phải ngưng không cho con bú.

[Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc]

Mặc dù thuốc có thể gây ra phản ứng bất lợi là đau đầu, chóng mặt nhưng ở tần xuất rất thấp nên khả năng lái xe và vận hành máy móc bị ảnh hưởng không đáng kể.

[Đặc tính dược lực học]

Tác dụng cải thiện các triệu chứng khác nhau có liên quan đến sự tăng trương lực cơ của Eperisone Hydrochloride là tổng hợp của các tác dụng dược lý như sau:

- Giãn cơ xương.
- Làm giảm trương lực cơ.
- Giảm sự nhạy cảm của tế bào cảm giác cơ vân và đáp ứng qua neuron vận động.
- Cải thiện dòng máu tới cơ.
- Giãn mạch và tăng lưu lượng tuần hoàn.

[Dược động học]

Eperisone Hydrochloride đã được sử dụng ở người lớn theo đường uống với liều 150 mg/ngày, trong 14 ngày liên tục. Vào ngày thứ 1, 8 và 14, thời gian trung bình để đạt tới nồng độ tối đa trong huyết tương nằm trong khoảng từ 1,6 đến 1,9 giờ. Nồng độ tối đa trung bình là từ 7,5 đến 7,9 ng/ml; thời gian bán thải trung bình là 1,6 đến 1,8 giờ.

Eperisone Hydrochloride được hấp thu tốt qua đường tiêu hoá. Thuốc phân bố đều trong máu, não, tủy sống, thần kinh đùi và các cơ. Thuốc được chuyển hóa qua gan, bài tiết một phần qua mật và tham gia vào chu trình gan – ruột. Thuốc thải trừ chủ yếu qua nước tiểu, một phần qua phân.

[Quá liều]



CS
UT
UTI

Chưa có dữ liệu đầy đủ về sử dụng quá liều Eperisone Hydrochloride. Tuy nhiên đã có báo cáo trường hợp trẻ em bị lên cơn động kinh khi bất ngờ ăn phải một lượng quá liều thông thường Eperisone Hydrochloride. Vì vậy nên sử dụng đúng liều được chỉ định.

[Bảo quản]

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, ở nhiệt độ dưới 30°C.

[Hạn dùng] 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TÀM TAY TRẺ EM.

Nhà sản xuất

HUTECS KOREA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

552-2, Yeongcheon-ri, Dongtan-myeon, Hwaseng-si, Gyeonggi-do, Korea



President. Lee Sang Il



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Khanh

