


MẪU HỘP



MẪU NHÃN



CÔNG TY CP TMĐP QUANG MINH
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Hiếu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thuốc bán theo đơn

Rx EUMASAVAF Tube 5g Cream

Kem bôi ngoài da

Công thức

- Betamethason dipropionat (Không phẩy mười hai gam) 0,12 g
- Acid salicylic..... 3g
- Tá dược (Cremophor A₂₅, Acid Stearic, Propylen glycol, Luvigel EM, Titandioxyd, Butyl hydroxy toluen, Nipazin, Bouquet, nước cất) vừa đủ..... 100 g

Dược lực học :

- Kết hợp giữa Acid salicylic có tác dụng làm tróc mạnh lớp sừng da và sát khuẩn nhẹ khi bôi trên da.
- Betamethason dipropionat là một kháng viêm nhóm Glucocorticoid.

Dược động học :

- Betamethason dipropionat được hấp thu qua da, chuyển hóa ở gan thành dạng không hoạt động và đào thải chủ yếu qua phân, một phần nhỏ qua nước tiểu.
- Acid salicylic được hấp thu dễ dàng qua da và bài tiết chậm qua nước tiểu, do vậy đã có trường hợp bị ngộ độc cấp salicylat sau khi dùng quá nhiều acid salicylic trên diện rộng của cơ thể.

Chỉ định :

- Điều trị các bệnh khô da & các bệnh lý tăng sừng da bán cấp hay mạn tính mà các bệnh lý này đáp ứng với điều trị bằng steroid tại chỗ như : bệnh vẩy nến(ngoại trừ vẩy nến dạng mảng lan rộng); dày sừng bàn tay và bàn chân; bệnh da dị ứng hay chàm mạn tính; chàm nội sinh hay viêm da dị ứng; chàm tiết bã; bệnh tổ đũa; chứng loạn tiết mồ hôi, liken phẳng và liken đơn; bệnh vẩy cá.

Cách dùng – Liều dùng :

- Sau khi rửa sạch và làm khô vùng da bị bệnh, thoa một lớp mỏng kem, mỗi ngày 1-2 lần sáng và tối.
- Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

Chống chỉ định :

- Mụn trứng cá đỏ, mụn trứng cá thường, viêm da quanh miệng. Ngứa vùng hậu môn & sinh dục. Sang thương da nguyên phát do nhiễm virus, nấm hay vi khuẩn, các tổn thương loét da. Bệnh da ở trẻ em < 1 tuổi, kể cả viêm da thường & hăm đỏ da do tã lót. Quá mẫn với thuốc.

Thận trọng :

- Nên tránh dùng điều trị dài ngày, nhất là với nhũ nhi và trẻ em (vì có thể xảy ra ức chế tuyến thượng thận). Thận trọng khi điều trị kéo dài vùng da mặt; khi bôi lên vùng da quanh mắt, thận trọng không để thuốc rơi vào mắt. Khi điều trị vẩy nến, luput dạng đĩa & chàm nghiêm trọng, cần theo dõi cẩn thận tình trạng bệnh nhân. Nên điều trị bằng kháng sinh đường toàn thân khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn lan rộng. Bôi thuốc trên diện tích da rộng hoặc dùng kéo dài, có thể tăng nguy cơ mẫn cảm da do tiếp xúc. Hấp thu acid salicylic do dùng kéo dài có thể dẫn đến ngộ độc salicylat. Thận trọng với phụ nữ có thai.

Tác dụng không mong muốn :

- Teo da tại chỗ như: vết nứt da, mỏng da, giãn các mạch máu bề mặt, đặc biệt khi băng kín hay trên vùng nếp gấp da. Thay đổi sắc tố da & rậm lông. Cường vỏ thượng thận(khi dùng lâu với số lượng nhiều hay dùng trên diện tích rộng). Quá mẫn (ngứa ngáy thuốc). Khô da, kích ứng da & vảy da(do acid salicylic).

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc : Không có

Quá liều và cách xử trí : Sử dụng quá liều có thể gây đỏ và cảm giác rát da.

Tương tác với các thuốc khác: Các tương tác với các thuốc khác chưa được khảo sát.

Phụ nữ mang thai và cho con bú :

Tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú vẫn chưa được thiết lập, do đó không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Điều kiện bảo quản : Bảo quản nơi khô mát (dưới 30°C), tránh ánh sáng.

Hạn dùng : 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Quy cách đóng gói : Tube 5 g. Hộp 1tube

Ghi chú : (Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc)

Để xa tầm tay của trẻ em .Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết xin hỏi ý kiến của Bác sĩ .

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH

04A Lò Lu – Phường Trường Thạnh – Q9 – TP.HCM. ĐT: 08.37300167 – Fax: 08.37301103

Email : Info@qmmediphar.com.vn - Web : WWW. Qmmediphar.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRUNG HIỀU