

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 27/12/2013

200mm
160mm

172/84 BS21


20mm

30mm

Cách dùng EVACENEMA

1. Vệ sinh sạch sẽ
2. Lắp ống thông vào chai
3. Giữ chặt bình một bàn tay, dùng ngón tay cái ấn nút để đẩy thuốc vào ống thông, cho đến khi thuốc tràn đầy ống thông và tràn ra ngoài miệng bệnh nhân.
4. Bóp chai nhẹ để hết chất lỏng bên trong được đẩy hoàn toàn vào trực tràng.
5. Giữ nguyên vị trí của ngón tay cái ấn nút để thuốc được đẩy hết vào trực tràng.

Có thể bôi Vaseline vào đầu ống thông trước khi sử dụng



Rx Thuốc bán theo đơn

EVACENEMA
PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Evacema chứa Natri phosphate và Dinatri phosphate có tác dụng như một thuốc nhuận trường để dự phòng hoạt động vệ sinh an toàn chưa hoàn toàn của trực tràng trong 2 đến 15 phút mà không gây ra cản trở hay cơ thắt. Có thể được sử dụng để làm giảm chứng táo bón thường xuyên, và hoạt động như một phần của cơ chế làm sạch ruột trong chuẩn bị phẫu thuật trực tràng, chụp x-quang hoặc nội soi.

Thành phần: mỗi ml chứa:
Monobasic natri phosphat 139.1 mg
Dibasic natri phosphat 31.8 mg

Chỉ định:
Giảm táo bón, chất nhuận tràng để làm sạch trực tràng chuẩn bị cho phẫu thuật trực tràng, chụp x-quang hoặc nội soi.

Liều dùng và cách dùng:
Sử dụng Evacema nên được hướng dẫn bởi bác sĩ. Liều khuyến dùng là mỗi lần một chai đối với người lớn và mỗi lần ½ chai đối với trẻ từ 2 đến 12 tuổi.

Cách sử dụng: nhẹ nhàng đưa Evacema vào trong trực tràng cho đến khi ống thông vào hẳn bên trong, sau đó bóp nhẹ chai để đẩy thuốc vào cơ thể cho đến khi gần hết dung dịch trong chai.

- Chống chỉ định và thận trọng:
1. Không dùng bất cứ thuốc nhuận trường nào, kể cả Evac, nếu có đau dạ dày, nôn và tiêu chảy.
 2. Việc lệ thuộc thuốc có thể xảy ra do dùng nhiều lần.
 3. Không sử dụng cho các bệnh nhân có chứng táo bón mãn tính, tắc ruột, không có hậu môn và suy tụt sung huyết.
 4. Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân bị suy chức năng thận, bệnh tim, có tiền sử rối loạn chất điện giải hay những bệnh nhân đang uống thuốc chẹn calcium, thuốc lợi tiểu, hay những thuốc khác có thể ảnh hưởng đến nồng độ chất điện giải.
 5. Không được dùng Evacema cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em.
Dùng thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ và dược sĩ.
Thuốc này có thể được sử dụng để làm thuốc giảm triệu chứng.

Xem tờ hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.

Bảo quản: Nơi khô, mát, nhiệt độ không quá 30 °C.
Quy cách đóng gói: chai 118 ml.

Nhà sản xuất:
PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD., GUANYIN PLANT
No. 26, Datong 1st Rd., Caota Village, Guanyin Township, Taoyuan County
328, Đài Loan (R.O.C.)
ĐT: +886-2-27660887

EVACENEMA

118ml

Mỗi ml chứa:
Monobasic natri phosphat 139.1 mg
Dibasic natri phosphat 31.8 mg
Chỉ định:
Giảm táo bón, chất nhuận tràng để làm sạch trực tràng chuẩn bị cho việc phẫu thuật trực tràng, chụp x-quang hoặc nội soi.

 **PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

DNKK: *

Vina No./SĐK: 970/01



Phân Phối

Rx Thuốc bán theo đơn

Tờ hướng dẫn sử dụng

Dung dịch bơm trực tràng EVACENEMA

(Monobasic natri phosphat 139,1 mg và Dibasic natri phosphat 31,8 mg)

Thành phần

Mỗi ml chứa:

Monobasic natri phosphat 139,1 mg
Dibasic natri phosphat 31,8 mg
Tá dược: kali sorbate, nước tinh khiết vừa đủ 1,0 ml

Mô tả

Chất lỏng trong suốt đựng trong chai màu xanh hình ống, mỗi chai chứa 118 ml.

Chỉ định

Trị táo bón, chất làm nhuận tràng dùng tẩy ruột, chuẩn bị để phẫu thuật trực tràng, chụp x-quang hay nội soi.

Dược động học

Nước không được hấp thu bởi việc dùng liều duy nhất hay đa liều. Sự hấp thu Natri ở mức tối thiểu (trung bình từ 5.5% đến 17%). Do sự hấp thu tối thiểu của Natri nên không có tác hại nào trên sức khỏe của người lớn và trên những người có chế độ ăn hạn chế muối. Hơn nữa, có ít ảnh hưởng trên các bệnh nhân bị suy tim sung huyết và các bệnh nhân bị giữ muối.

Sự hấp thu của Phosphat có liên quan đến thời gian thuốc lưu giữ trong cơ thể. Sự hấp thu phosphat cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: nồng độ calci (nồng độ calci thấp làm tăng sự hấp thu của phospho), hormon tăng trưởng, Vitamin D, và hormon tuyến cận giáp (PTH). Do cơ chế bù làm thúc đẩy sự bài tiết nước tiểu, phosphat không bị giữ lại trong cơ thể người khỏe mạnh. Phosphat không bị phân phối đến các mô của cơ thể. Sự tăng phosphat trong huyết thanh có thể xảy ra có thể xảy ra trên những bệnh nhân thiếu năng thận. Việc giữ lại lâu hơn của thuốc Evacenema trong cơ thể làm tăng sự hấp thu của phospho. Trong sử dụng lâm sàng, sự lưu giữ của Evacenema trong thời gian ngắn được khuyến nghị nhưng đối với các bệnh nhân bị tắc ruột chức năng hoặc thực thể, Evacenema được đề nghị giữ lại trong cơ thể với thời gian lâu hơn. Một nghiên cứu cho thấy khoảng thời gian mà EVACENEMA lưu lại trong cơ thể có ảnh hưởng đến sự hấp thu phospho và nồng độ phospho trong huyết thanh. Trong 30 phút dùng thuốc, sự tăng phospho và giảm calci trong huyết tương đã được nhận thấy ở mỗi nhóm nghiên cứu.

Dược lực học

Theo đường dùng bơm trực tràng, các hoạt chất phát huy tác dụng nhuận tràng thông qua đặc tính thẩm thấu của chúng. Kết quả của việc giữ dung dịch thuốc trong ruột là làm tăng sự bài xuất phân.

Liều dùng và Cách sử dụng

- Sử dụng Evacenema theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Liều dùng khuyến cáo: mỗi lần một chai đối với người lớn và mỗi lần ½ chai đối với trẻ từ 2 đến 12 tuổi.
- Cách dùng: nhẹ nhàng đưa thuốc Evacenema vào trực tràng cho đến khi ống thông vào hẳn bên trong, sau đó bóp nhẹ chai để đẩy thuốc vào cơ thể cho đến khi gần hết dung dịch trong chai.

Chống chỉ định

Trẻ em dưới 2 tuổi, to đại tràng bẩm sinh, tắc ruột, không có hậu môn và suy tim sung huyết.

Cảnh báo & Thận trọng

- Không dùng bất cứ thuốc nhuận tràng nào, kể cả Evacenema, nếu có đau dạ dày, nôn và tiêu chảy.
- Việc lệ thuộc thuốc có thể xảy ra do dùng nhiều lần.



- Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân bị suy chức năng thận, bệnh tim, có tiền sử rối loạn chất điện giải hay những bệnh nhân đang dùng thuốc chẹn calci, thuốc lợi tiểu, hay những thuốc khác có thể ảnh hưởng đến nồng độ chất điện giải.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Chưa có báo cáo

Tương tác thuốc: Thận trọng khi dùng chung các thuốc chẹn calci, thuốc lợi tiểu, hay những thuốc khác có thể ảnh hưởng đến nồng độ chất điện giải.

Phản ứng phụ: Hạ calci máu, tăng phosphat máu, tăng natri máu, toan máu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng.

Quá liều: Không nên dùng quá liều trừ khi có chỉ định của thầy thuốc.

Cảnh báo khác:

- Dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và dược sĩ.
- Thuốc được dùng theo hướng trợ giúp.
- Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản: nơi khô, mát, nhiệt độ không quá 30° C.

Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

Qui cách đóng gói: Chai 118 ml.

Tiêu chuẩn: USP 32.

Nhà sản xuất

Purzer Pharmaceutical Co. Ltd., Guanyin Plant.

No. 26, Datong 1st Rd, Caota Village, Guanyin Township, Taoyuan County 328, Đài Loan (R.O.C).

Ngày 07 tháng 08 năm 2013

Giám Đốc



Lê Thị Tâm



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh