




BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/06/2018



Hướng dẫn sử dụng thuốc
EYECOM

- **Dạng thuốc:** Viên nang mềm

- **Qui cách đóng gói:** Hộp 9 vỉ x 10 viên nang mềm.

- **Thành phần:** Mỗi viên nang mềm chứa:

Natri chondroitin sulfat	100mg	Vitamin A (Retinyl palmitat)	2500IU
Vitamin B ₁ (Thiamin nitrat)	20mg	Vitamin B ₂ (Riboflavin)	5mg
Cholin hydrotartrat	25mg	Tá dược vđ	1 viên

(Tá dược gồm: Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, lecithin, polysorbat 80, Colloidal silicon dioxyd, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol 70%, nipagin, nipasol, vanilin, phẩm màu Chlorophyl E140, phẩm màu Pantent blue V, titan dioxyd, ethanol 96%, nước tinh khiết).

- **Chỉ định:** Hỗ trợ điều trị các trường hợp:

- Nhức mỏi mắt, viêm giác mạc, đau nhức mắt.
- Giảm thị lực trong thời kỳ cho con bú.
- Chứng quáng gà.
- Suy yếu thị lực (nhìn mờ, nhìn kém...).

- **Cách dùng và liều dùng:**

Liều thông thường cho người lớn là: 1 viên/ lần x 2 lần/ngày.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên dùng 1 viên/ngày

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Người bệnh thừa vitamin A.

- **Thận trọng:**

- **Vitamin B₂:** Trong thời gian dùng thuốc nước tiểu có thể có màu vàng vì có chứa Vitamin B₂, khi ngừng thuốc sẽ hết.

- **Vitamin A:** Cần thận trọng khi có dùng thuốc khác có chứa vitamin A.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú nhưng phải theo chỉ định của bác sĩ.

- **Tác dụng không mong muốn:** Thuốc có thể gây rối loạn tiêu hoá nhẹ: Buồn nôn, nôn... Tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng liều cao vitamin A

Uống vitamin A dùng liều cao kéo dài có thể gây đến ngộ độc vitamin A. Các triệu chứng đặc trưng là: Mệt mỏi, dễ bị kích thích, chán ăn, sụt cân, nôn, rối loạn tiêu hoá, sốt, gan-lách to, da bị biến đổi, rụng tóc, tóc khô giòn, môi nứt nẻ và chảy máu, thiếu máu, nhức đầu, calci huyết cao, phù nề dưới da, đau ở xương khớp. Trẻ em các triệu chứng ngộ độc mạn tính bao gồm cả tăng áp lực nội sọ (thóp căng), phù gai mắt, ù tai, rối loạn thị giác, sưng đau dọc xương dài. Hầu hết các triệu chứng mất dần khi ngừng sử dụng thuốc. Uống vitamin A liều cao dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu: buồn ngủ, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, nhức đầu, mê sảng, co giật, ỉa chảy... Các triệu chứng xuất hiện sau khi uống thuốc từ 6 đến 24 giờ. Đối với phụ nữ mang thai, liều Vitamin A trên 8.000IU mỗi ngày có thể gây ngộ độc cho thai nhi.

Khi thấy các triệu chứng ngộ độc phải ngừng sử dụng thuốc và xử trí theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

* **Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:**

* **Vitamin A:** Neomycin, cholestyramin, parafin lỏng làm giảm hấp thu vitamin A. Các thuốc tránh thai có thể làm tăng nồng độ vitamin A trong huyết tương và có tác dụng



không thuận lợi cho sự thụ thai. Cần tránh dùng đồng thời vitamin A với isotretinoin vì có thể dẫn đến tình trạng như dùng vitamin A quá liều.

* **Vitamin B₂**: Đã gặp một số ca "thiếu riboflavin" ở người đã dùng clopromazin, imipramin, amitriptilin và adriamycin. Rượu có thể gây cản trở hấp thu riboflavin ở ruột. Probenecid sử dụng cùng riboflavin gây giảm hấp thu riboflavin ở dạ dày, ruột.

- Quá liều và xử trí:

* Vitamin A (Dùng 100.000UI/ngày x 10-15 ngày liền, hoặc phụ nữ có thai không dùng quá 8000UI/ngày) gây ngứa khô tóc, chán ăn buồn nôn.

Khi gặp phải những dấu hiệu và triệu chứng quá liều cần phải ngừng thuốc ngay và đến cơ sở y tế gần nhất.

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.**

* **Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

-Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C.

-Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

**"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"**

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DUỐC PHẨM HÀ TÂY

La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203-33516101. FAX: 04.33522203

CÔNG TY C.P DUỐC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Nguyễn Bá Lai

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh