

Rx - Thuốc kê đơn

FLUIDASA 200 mg

Cốm pha dung dịch uống

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói chứa:

Hoạt chất: Acetylcystein..... 200 mg

Tá dược: Sucrose, sodium saccharin, hương vị cam, phẩm màu vàng FD & C số 6 ánh bạc CI 15985, phẩm màu vàng FD & C số 10 ánh bạc CI 15985, colloidal silicon dioxid.

DƯỢC LỰC HỌC:

Acetylcystein (N-acetylcystein) là dẫn chất N-acetyl của L-cystein, một amino - acid tự nhiên. Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy và thuốc giải độc khi quá liều paracetamol. Thuốc làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mủ hoặc không bằng cách tách đôi cầu nối disulfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học.

Acetylcystein dùng để bảo vệ chống gây độc cho gan do quá liều paracetamol, bằng cách duy trì hoặc khôi phục nồng độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyển hóa trung gian của paracetamol gây độc cho gan. Trong quá liều paracetamol, một lượng lớn chất chuyển hóa này được tạo ra vì là đường chuyển hóa chính (liên hợp glucuronid và sulfat) trở thành bão hòa. Acetylcystein chuyển hóa thành cystein kích thích gan tổng hợp glutathion và do đó, acetylcystein có thể bảo vệ được gan nếu bắt đầu điều trị trong vòng 12 giờ sau khi quá liều Paracetamol. Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.

Hướng dẫn sử dụng thuốc

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Sau khi uống, acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan khử acetyl thành cystein và sau đó được chuyển hóa. Thuốc đạt nồng độ đỉnh huyết tương trong khoảng 0,5 đến 1 giờ sau khi uống liều 200mg đến 600mg. Khả dụng sinh học khi uống thấp và có thể do chuyển hóa trong thành ruột và chuyển hóa bước đầu trong gan. Độ thanh thải thận có thể chiếm 30% độ thanh thải toàn thân.

CHỈ ĐỊNH:

FLUIDASA được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh nhày nhớt (mucoviscidosis) trong các bệnh lý hô hấp có đờm dầy quánh.

- Viêm phế quản cấp và mãn tính, hen phế quản, khí thũng, viêm phổi phế quản, ap xe phổi, giãn phế quản, xẹp phổi, viêm tiểu phế quản, bệnh nhày nhớt.

- Tai mũi họng: viêm tai, viêm xoang, viêm mũi hầu, viêm thanh khí quản.

- Viêm phế quản liên quan đến lao phổi.

- Dự phòng và điều trị biến chứng tắc nghẽn và nhiễm trùng trong phẫu thuật mở khí quản: soi phế quản, chụp Xquang phế quản.

- Phẫu thuật: Dự phòng các biến chứng phế quản phổi khi phẫu thuật (ngực, bụng..).

- Giải độc khi ngộ độc paracetamol.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Thuốc dùng đường uống.

Liều thông thường cho trẻ em:

Liều trung bình: 1/2 gói, 2-4 lần/ngày tùy theo

tuổi

Liều thông thường của người lớn:

Liều trung bình 1 gói, 3 lần/ngày.

Hướng dẫn sử dụng: Cho ½ gói thuốc (trẻ em) hoặc 1 gói thuốc vào một cốc nước, hòa tan.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người già bị suy hô hấp nặng và bệnh nhân hen.

Mẫn cảm với acetylcystein hoặc một trong các thành phần của thuốc.

Cần nhắc lợi ích và nguy cơ khi sử dụng thuốc cho người đã chảy máu đường tiêu hóa (giãn tĩnh mạch thực quản, loét dạ dày).

Trẻ em dưới 2 tuổi.

THẬN TRỌNG:

Bệnh nhân hen phế quản phải được kiểm soát chặt chẽ. Nếu có thắt phế quản, phải ngừng điều trị.

Trong trường hợp tăng tiết quá mức đặc biệt ở trẻ nhỏ hoặc người ốm nặng, phải bất động, nên cân nhắc dùng các chất hút dịch tiết.

Không nên dùng acetylcystein cho bệnh nhân có khả năng khắc đờm trừ khi sử dụng phương pháp trị liệu vật lý ở đường hô hấp.

Dung dịch acetylcystein có thể có mùi lưu huỳnh nhẹ và không cần phải thay thế.

Nên uống thuốc cùng bữa ăn để tránh rối loạn dạ dày.

Để tăng tác dụng của thuốc nên uống nhiều nước trừ khi thấy thuốc không cho sử dụng.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NGƯỜI CHO CON BÚ:

Chưa thấy tác dụng của Acetylcystein đối với phụ nữ cho con bú, chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Phụ nữ có thai: Loại B.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Các tác dụng không mong muốn phải chú ý: Phản ứng mẫn cảm như phát ban và co thắt phế quản.

Các tác dụng không mong muốn sau không

cần quan tâm về y tế nếu chúng không quá khó chịu: Tiêu chảy, nôn, buồn nôn.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc !

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Kháng sinh penicillin bán tổng hợp làm tăng nồng độ huyết thanh.

Kháng sinh cephalosporin thế hệ 1 làm giảm nồng độ thuốc trong huyết thanh.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Các trường hợp quá liều chưa được báo cáo. Acetylcystein được dùng liều rất cao ở người không mà không thấy các tác dụng thứ phát, loại trừ khả năng gây độc do quá liều. Nếu cần thiết đặt dẫn lưu tư thế và thông khí quản.

TRÌNH BÀY:

Hộp 30 gói x 1 g.

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN:

Nhà sản xuất.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ từ 15-30°C.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ THUỐC HÃY HỎI BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ.

Sản xuất bởi:

Laboratorio Farindustria, S.A

Jr. Mariscal Miller No 2151,

Lince Lima, Peru

Nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương, tỉnh Bình Dương.