

528/045

* Nhãn trên hộp 10 vỉ x 10 viên (bổ sung lần 2):

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ HIỆ DUYỆT
Lần đầu 12/1/2014



GLUCOSAMIN
Glucosamin sulfat 500 mg
HỘP 10 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM

HỘP 10 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM GMP - WHO

GLUCOSAMIN
Glucosamin sulfat 500 mg
DHG PHARMA

THÀNH PHẦN:
Glucosamin sulfat 500 mg
(tương đương 392,62 mg Glucosamin)
Tá dược vừa đủ 1 viên
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Nên uống Glucosamin trong bữa ăn.
Người lớn: 1 viên x 3 lần/ ngày.
Dùng liên tục ít nhất 2 - 3 tháng.
Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.
CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH -
CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Tư Vấn Khách Hàng
0710.3899000
www.dhgpharma.com.vn
Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555



BOX OF 10 BLISTERS X 10 FILM COATED CAPLETS GMP - WHO
GLUCOSAMIN
Glucosamine sulfate 500 mg
DHG PHARMA

COMPOSITION:
Glucosamine sulfate 500 mg
(equivalent to 392.62 mg of Glucosamine)
Excipients q.s. 1 caplet
DOSAGE & ADMINISTRATION - INDICATIONS -
CONTRAINDICATIONS - OTHER INFORMATION:
See the enclosed leaflet.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
STORAGE CONDITIONS:
Store in dry places, not exceeding 30°C, protect from light.



SBK (Reg. No.):

Ngày SX (Mfg. date):
Số 10 SX (Batch. No.):
HD (Exp. date):

* Nhãn trên chai 100 viên (bổ sung lần 2):

THÀNH PHẦN:
Glucosamin sulfat 500 mg
(tương đương 392,62 mg Glucosamin)
Tá được vừa đủ 1 viên

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Nên uống Glucosamin trong bữa ăn.
Người lớn: 1 viên x 3 lần/ ngày.
Dùng liên tục ít nhất 2 - 3 tháng.
Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH -
CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

SĐK:
Tư Vấn Khách Hàng
0710.3899000
www.dhgpharma.com.vn 819352061010299

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555

GLUCOSAMIN
Glucosamin sulfat 500 mg
DHG PHARMA

* Nhãn trên chai 150 viên (bổ sung lần 2):

THÀNH PHẦN:
Glucosamin sulfat 500 mg
(tương đương 392,62 mg Glucosamin)
Tá được vừa đủ 1 viên

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Nên uống Glucosamin trong bữa ăn.
Người lớn: 1 viên x 3 lần/ ngày.
Dùng liên tục ít nhất 2 - 3 tháng.
Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH -
CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

SĐK:
Tư Vấn Khách Hàng
0710.3899000
www.dhgpharma.com.vn 819352061008449

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555

GLUCOSAMIN
Glucosamin sulfat 500 mg
DHG PHARMA

* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc: (Bổ sung lần 2)



GLUCOSAMIN

Glucosamin sulfat 500 mg

CÔNG THỨC:

Glucosamin sulfat 500 mg

(tương đương 392,62 mg Glucosamin)

Tá được vừa đủ 1 viên

(Tinh bột biến tính, PVP K30, sodium starch glycolat, magnesi stearat, talc, HPMC, PVA, PEG 6000, titan dioxyd, màu eurolake ponceau, oxyd sắt vàng).

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén dài bao phim.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên. Chai 150 viên.

TÍNH CHẤT: Glucosamin là một amino - monosaccharid, nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan. Khi vào cơ thể, Glucosamin tập trung ở xương và khớp, kích thích tế bào sụn sản xuất proteoglycan và collagen. Glucosamin ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholipase A2 và giảm các gốc tự do superoxide phá hủy các tế bào sụn. Glucosamin còn kích thích sản sinh mô liên kết của xương, làm giảm quá trình mất calci của xương. Ngoài ra, Glucosamin còn làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp.

Glucosamin có tác dụng làm giảm triệu chứng của viêm khớp gối như đau, khó vận động, phục hồi cấu trúc sụn khớp, ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp.

CHỈ ĐỊNH: Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

THẬN TRỌNG: Chưa tìm thấy tài liệu.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Glucosamin có thể gây tăng đề kháng Insulin và do đó ảnh hưởng đến sự dung nạp glucose.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Hiếm gặp: buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Trong trường hợp dùng quá liều nên thông báo ngay cho bác sĩ.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Nên uống Glucosamin trong bữa ăn.

Người lớn: 1 viên x 3 lần/ ngày. Dùng liên tục ít nhất 2 - 3 tháng.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG

Khu công nghiệp Tân Phú Thành, Châu Thành A, Hậu Giang

ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555

Tư Vấn Khách Hàng
☎ 0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

www.dhgpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Nam