

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HOÀN TIÊU DAO P/H

Thành phần: (cho 1 viên)

Sài hồ (<i>Radix Bupleuri</i>)	: 20mg	Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	: 15mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	: 20mg	Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	: 4mg
Bạch linh (<i>Poria</i>)	: 20mg	Gừng tươi (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	: 22mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	: 19mg	Tinh bột sắn (<i>Amylum Manihoti</i>)	: 10mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	: 19mg	Than hoạt tính (<i>Carbo activatus</i>)	: 1mg
Chi tử (<i>Fructus Gardeniae</i>)	: 15mg	Sáp ong trắng (<i>Cera alba</i>)	: 2mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	: 15mg		

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 360 viên, hộp 1 lọ x 480 viên.

Chỉ định:

Hoàn tiêu dao P/H có tác dụng sơ can giải uất, kiện tỳ, dưỡng huyết, thuốc dùng trong các trường hợp: Tinh thần mệt mỏi, chân tay đau mỏi, ngực sườn đau trướng, người gầy, ăn kém, đau đầu, chóng mặt, trí nhớ giảm, hay có cơn bốc hỏa, hay tức giận, ngủ ít, hay nằm mê, miệng khô, táo bón, mụn, da sạm, kinh nguyệt không đều.... Các triệu chứng này thường xuất hiện trong các chứng bệnh suy nhược thần kinh, phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh.

Cách dùng & liều dùng:

- Liều dùng: Ngày uống 3 lần sau bữa ăn:
- Trẻ em từ 3 - 6 tuổi, mỗi lần 5 - 10 viên.
- Trẻ em từ 7 - 13 tuổi, mỗi lần 15 - 20 viên.
- Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30 viên.
- Uống thuốc với nước đun sôi để nguội.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định:

Không dùng thuốc cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Tương tác với các thuốc khác:

Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Email: phuchungph@vnn.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hưng