



MẪU NHÃN TUBE, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

1. MẪU HỘP



2. MẪU NHÃN TUBE



CTY CPTM DƯỢC PHẨM QUANG MINH

P. GIÁM ĐỐC



BS. Đặng Bích Thùy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

R KETODEXA Tube 5 g **Kem bôi ngoài da**

Công thức: Cho 1 tube 5 g

Ketoconazol.....100 mg
Cloramphenicol.....100 mg
Dexpanthenol.....100 mg

Tá dược (Dầu mù u, Nipazin, Natri Sulfít, Cremophor A6, Cremophor A25, Glycerin, Luvigel EM, Propylrn Glycol, Cetyl Alcol, EDTA, Tinh dầu táo, Bouquet, Titandioxid, Nước cất) vừa đủ.....5 g.

Dược lực học :

Kết hợp giữa Chloramphenicol là một kháng sinh kim khuẩn và Ketoconazol là thuốc trị vi nấm nhóm Imidazol. Dexpanthenol có tính chất làm tăng sinh biểu mô, kích thích sự tạo da non mới trên các vùng da bị tổn thương do vi nấm.

Dược động học.

- Chloramphenicol được hấp thu qua da, chuyển hoá ở gan thành dạng không hoạt động và đào thải chủ yếu qua nước tiểu dưới dạng kết hợp với acid Glucuronic . Khoảng 1% được đào thải qua phân.
- Ketoconazol được hấp thu qua da, chuyển hoá ở gan thành dạng không hoạt động và đào thải chủ yếu qua phân , một phần nhỏ qua nước tiểu.

Chỉ định :

- Lang ben, hắc bào, nước ăn chân, tay
- Nấm móng chân, móng tay, nấm tóc.
- Viêm da, bội nhiễm da, bỏng nhẹ.

Cách dùng – Liều dùng :

- Rửa sạch và lau khô vùng da bị tổn thương. Thoa một lớp kem mỏng . Mỗi ngày 1 – 2 lần.
- Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Chống chỉ định :

- Dị ứng với các thành phần trong công thức
- Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Thận trọng :

- Không được uống
- Không dùng trong niêm mạc
- Để xa tầm tay của trẻ em.

Tác dụng không mong muốn :

- Có thể gây đỏ và cảm giác rát da, nổi ban đỏ.
- Trường hợp hiếm gặp do tác dụng không mong muốn của cloramphenicol có thể gây giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, thiếu máu, hội chứng xám ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới hai tuần tuổi.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc : Không có

Tương tác thuốc : Chưa thấy có tương tác với các thuốc khác.

Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú : Không sử dụng đối với phụ nữ có thai và cho con bú

Sử dụng quá liều :

- Sử dụng quá liều có thể gây đỏ và cảm giác rát da.

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Điều kiện bảo quản : Bảo quản nơi khô mát (dưới 30°C), tránh ánh sáng.

Hạn dùng : 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

Quy cách đóng gói : Hộp 1 tube 5 g.

Ghi chú : (*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc*)

Thuốc bán theo đơn. Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin chi tiết xin hỏi ý kiến của Bác sĩ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH

Sản xuất tại : 4A Lò Lu – P. Trường Thạnh – Quận 9 – TP. HCM. ĐT : 08.37300167 - Fax : 08.37301103

Email : Info@qmmediphar.com.vn - Web : WWW.Qmmediphar.com.vn