

PHIL
INTER PHARMA

PHIL INTER PHARMA

25, street 8, Vietnam-Singapore Industrial park, Binh Dương
Tel: 0650. 3767 040~ 044. Fax: 0650. 3767 039

MẪU NHÃN HỘP

Sản phẩm : Viên nang **KOSENA**

Kích thước hộp : 114 x 33 x 114 mm

Tỷ lệ : 100%

Nội dung : như mẫu



CAO SÂM NHUNG TRIỀU TIÊN
Cao sâm nhung tiêu chuẩn hóa được có đặc từ nhân sâm Triều Tiên.
Cao nhung sâm, nấm linh chi, Vitamin E, Vitamin B có trong công thức
bảo vệ sức khỏe và tăng cường thể lực.
DÙNG XA TẮM TAY TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.

THÀNH PHẦN mỗi viên nang mềm chứa:
Cao nhân sâm Triều Tiên 100mg
Cao Ginsengoma (nấm linh chi) 30mg
Cao nhung hươu 30mg
Vitamin B (Biotin) 12mg
Vitamin E (Tocopherol) 12mg
CHỈ ĐỊNH
- Giúp nâng cao sức khỏe, hoạt động thể lực và tinh thần quả táo, gây yếu thần kinh, thời kỳ dưỡng bệnh, mệt mỏi.
- Điều trị hỗ trợ trong các trường hợp sau: ung thư, viêm gan mạn tính.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Người lớn: dùng một hoặc hai viên mỗi lần, hai lần mỗi ngày, sau bữa ăn.
THẬN TRỌNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc hướng dẫn sử dụng.
BẢO QUẢN Trong hộp kín, nơi khô, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 6 viên/ngày, 6 viên/ngày.



TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

LÊ THANH HIỆU

PHIL
INTER PHARMA


PHIL INTER PHARMA

No 25, street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong

Tel: 0650. 3767 040~ 044. Fax: 0650. 3767 039

MẪU NHÃN VỈ

Sản phẩm : Viên nang **KOSENA**
Kích thước vỉ : 30 x 90 mm
Tỷ lệ : 100%
Nội dung : như mẫu



Số lô SX, NSX, HD sẽ được dập nổi trên vỉ

TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


LÊ THANH HIẾU

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ

SDK:

Viên nang mềm KOSENA

◆ THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất

Cao nhân sâm Triều Tiên	120mg
Cao Ganoderma (linh chi)	30mg
Cao nhung hươu	30mg
Vitamin E (Tocopheryl acetate)	12mg
Vitamin B ₂ (Riboflavin).....	1,2mg

ph

Tá dược:

Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, dầu lecithin, gelatin, glycerine đậm đặc, ethyl vanillin, methyl paraben, propyl paraben, màu xanh số 1, màu vàng số 5, titan dioxyd, màu đỏ số 3, nước tinh khiết.

◆ CHỈ ĐỊNH

- Suy nhược thần kinh, hoạt động thể lực và tinh thần quá sức, gầy yếu, chán ăn, thời kỳ dưỡng bệnh, mệt mỏi.
- Điều trị hỗ trợ trong các trường hợp sau: ung thư, viêm gan mạn tính.

◆ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: Một hoặc hai viên nang mỗi lần, hai lần mỗi ngày. Uống thuốc với nước sau bữa ăn.

Liều dùng có thể được tăng hoặc giảm tùy theo độ tuổi và triệu chứng bệnh.

◆ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không dùng thuốc cho những bệnh nhân bị quá mẫn với thuốc này hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai.

◆ THẬN TRỌNG

- 1) Ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trong trường hợp buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và ngứa do dùng thuốc này.
- 2) Ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trong trường hợp tiêu chảy, táo bón, phát ban do dùng thuốc.
- 3) Dùng thuốc này có thể gây ra đa kinh, bệnh kinh nguyệt. Nếu tiếp tục bị chảy máu, hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- 4) Nếu thấy thuốc kém hiệu quả sau khi dùng một tháng, nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

◆ TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa được biết.

◆ SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có nghiên cứu về độ an toàn của thuốc trên phụ nữ cho con bú, vì vậy thận trọng khi dùng.

Xem phần *Chống chỉ định*

◆ ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có

◆ TÁC DỤNG PHỤ

Cho đến nay chưa có báo cáo về tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc đáng kể nào. Hiếm có báo cáo về phản ứng dị ứng da nhẹ khi dùng thuốc này. Tác dụng kích thích của nhân sâm đã được khẳng định tuy nhiên cũng có thể xảy ra tác dụng phụ như tiêu chảy buổi sáng, phát ban da, mất ngủ, căng thẳng thần kinh, tăng

huyết áp, hưng phấn và phù. Hội chứng lạm dụng nhân sâm được định nghĩa bao gồm tăng huyết áp kèm theo căng thẳng, mất ngủ, phát ban da và tiêu chảy buổi sáng được báo cáo.

*** Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

◆ **QUÁ LIỀU**

Quá liều thường có những triệu chứng sau: mất ngủ, căng cơ, sưng hoặc phù cơ thể.

Cho đến nay chưa có báo cáo về trường hợp quá liều.

Nếu xảy ra trường hợp quá liều: ngay lập tức rửa dạ dày và tham vấn ý kiến của nhân viên y tế.

◆ **ĐÓNG GÓI:** 05 viên/vi, 06 vi /hộp

◆ **BẢO QUẢN:** Trong hộp kín, nơi khô, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

◆ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất tại: **CTY TNHH PHIL INTER PHARMA.**
25, đường số 8, khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương

TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG



LÊ THANH HIỆU

Read the insert paper carefully before using

Keep out of reach of children

For any more information, please consult your doctor or pharmacist

Registration Number:

KOSENA soft capsule

◆ **COMPOSITION**

Each capsule contains:

Active ingredients:

Korean Ginseng Extract	120mg
Ganoderma Extract	30mg
Antler Extract	30mg
Tocopheryl acetate	12mg
Riboflavin	1.2mg

Inactive ingredients: Soybean oil , Palm oil, White bee's wax, lecithin oil, gelatin, concentrated Glycerin, Ethyl vanillin, Methyl paraben, Propyl paraben, Blue No.1, Yellow No.5, Titanium dioxide, Red No. 3, Purified water.

◆ **INDICATIONS**

- Physical and psychological overwork, nervous prostration, weakness, anorexia, convalescence, fatigue.
- Adjunct therapy in the following cases: cancer , chronic hepatitis

◆ **DOSAGE AND ADMINISTRATION**

Adults: Take one or two capsules, two times daily with water by oral administration after meals. Increase and decrease properly by ages and symptoms.

◆ **CONTRA-INDICATIONS**

- Do not use for patients who is hypersensitive to any of the composition.
- Pregnancy

◆ **PRECAUTIONS:**

- 1) Stop administrating and consult your doctor or pharmacist in cases of vomiting, nausea, diarrhea, pruritus due to taking this medicine.
- 2) Stop administrating and consult your doctor or pharmacist in cases of diarrhea, constipation, rash, ruber due to taking this medicine.
- 3) Administration of this medicine may cause hypermenorrhea and emmeniopathy. If bleeding is continued, consult your doctor and pharmacist.
- 4) If you think that the drug have too little effect in one month, you should discuss the matter with your doctor or pharmacist.

◆ **DRUG INTERACTION:** Not known.

◆ **USE IN PREGNACY AND LACTATION**

In lactation, there are no human studies on the drug safety, therefore the dug should be consumed with caution.

See *Contra-indications*

◆ **EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND OPERATE MACHINES:** no effects.

◆ **SIDE EFFECTS**

No serious or significant adverse reactions have been reported to date. However, as with any supplement, contact your doctor of you are taking a prescription medicine, are pregnant or lactating. There have been rare reports of mild allergic skin reaction with the use of the extract in this product. The stimulant effects of ginseng were confirmed but there was also a high incidence of side effects including morning diarrhea, skin eruptions, sleeplessness, nervousness, hypertension, euphoria and edema. The ginseng abuse

syndrome' defined as hypertension together with nervousness, sleeplessness, skin eruptions, and morning diarrhea was reported.

** Inform your doctor or pharmacist in cases of any adverse reactions related to drug use.*

◆ **OVERDOSE:**

Overdose is characterized by sleeplessness, muscle tension, and swelling or fluid retention. No overdose has been reported so far.

If you happen to overdose: gastric lavage and seek medical attention immediately.

◆ **PACKING UNITS:** 5 capsules/blister, 6 blisters/box.

◆ **STORAGE:** Store in air-tight container, dry place, protect from light, below 30°C.

◆ **SHELF LIFE:** 36 months from manufacturing date.

Manufactured by: **PHIL INTER PHARMA CO., LTD.**

25, Street No.8, VSIP, Thuan An, Binh Duong

TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

