

MẪU NHÃN THUỐC MỠ TRA MẮT OFTAGEL

1. Tuýp 3 g



2. Hộp 1 tuýp 3g



Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

THUỐC MỠ TRA MẮT OFTAGEL

Công thức cho 1 tuýp thành phẩm (3g):

Neomycin sulfat 10.200 UI

Polymycin B sulfat 30.000 UI

Tá dược vừa đủ

Các đặc tính dược lực học:

- Neomycin sulfat là kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid, có tác dụng diệt khuẩn bằng cách ức chế quá trình sinh tổng hợp protein của các vi khuẩn nhạy cảm như: *Staphylococcus aureus*, *E.coli*, *Klebsiella*, *H.influenzae*, *Enterobacter* các loại, *Neisseria* các loại). Không có tác dụng với *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococci*.

- Polymycin B là nhóm những chất kháng sinh có mối liên quan chặt chẽ do các chủng *Bacillus polymyxa* tạo nên. Hoạt tính kháng khuẩn của Polymycin B hạn chế trên các vi khuẩn Gram âm như: *Enterobacter*, *E.coli*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Pasteurella*, *Bordetella*, *Shigella* và *Pseudomonas aeruginosa*.

Polymycin B có tác dụng diệt khuẩn gắn vào phospholipid làm thay đổi tính thấm và thay đổi cấu trúc màng bào tương vi khuẩn, gây rò rỉ các thành phần bên trong.

Các đặc tính dược động học:

Thuốc mỡ tra mắt Oftagel được dùng tại chỗ để điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở mắt và các mi mắt.

Chỉ định: Điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở mắt và các mi mắt.

Chống chỉ định:

- Không được dùng với người có dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.

- **Lưu ý:** Trong trường hợp mắt bị viêm nhiễm, tuyệt đối chống chỉ định đeo kính áp tròng trong suốt thời gian điều trị.

Liều dùng - cách dùng:

- Tra một dải thuốc mỡ (khoảng 0,5cm) vào mắt bị bệnh.

- Ngày tra 2-3 lần tùy theo bệnh nặng hay nhẹ, dùng trong 7 ngày.

Tương tác thuốc :

- Neomycin có thể làm giảm hấp thu các thuốc khác như phenoxymethyl penicilin, digoxin.

- Thuốc có thể làm giảm hiệu quả của thuốc tránh thai.

- Dùng chung với các thuốc lợi tiểu mạnh như acid ethacrynic, furosemid làm giảm khả năng gây độc với thận và thính giác.

- Neomycin làm tăng tác dụng chống đông của cumarin bằng cách giảm dự trữ vitamin K.

Thận trọng:

- Không được điều trị kéo dài quá thời hạn ấn định của bác sĩ

- Trường hợp dùng thuốc thấy xuất hiện những triệu chứng khác thường phải nhanh chóng đến bác sĩ khám lại.

- Nếu có nghi ngờ cần phải hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ

Tác dụng không mong muốn (ADR):

- Thuốc này có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn khi sử dụng như: kích thích thoáng qua, phản ứng, dị ứng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Phụ nữ có thai và cho con bú: Chưa có dữ liệu thông báo về độ an toàn. Do đó, chỉ nên dùng thuốc khi thật cần thiết

Quá liều và cách xử trí: Chưa được ghi nhận với dạng thuốc tra mắt. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu hoặc triệu chứng độc với thận hay với tai thuốc phải dừng thuốc ngay. Theo dõi chức năng thận và thính giác. Hỗ trợ hô hấp nếu cần.

Quy cách đóng gói: - Hộp 1 tuýp 3g.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng .

Tiêu chuẩn áp dụng: Theo tiêu chuẩn cơ sở.

“THUỐC NÀY CHỈ ĐƯỢC DÙNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA THẦY THUỐC”

“ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ “

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Đường Hữu nghị – TP. Đồng Hới - Quảng Bình - Việt nam

ĐT: (052) 3 822475 - 3 822346

Fax: 052. 3820720

Ngày ...24... tháng ...8... năm 2011.

C.TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

KT GIÁM ĐỐC
CỘNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
QUẢNG BÌNH
TP. ĐỒNG HỚI - T. QUẢNG BÌNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đs. Nguyễn Thị Mai