

THUỐC NHỎ MẮT, MŨI, TAI

Otivacin

THUỐC NHỎ MẮT, MŨI, TAI

Neomycin 28000 IU
Dexamethasone phosphat 8mg

(Rx)

Thuốc bán theo đơn



8ml

DK Pharma
GMP-WHO

Nhà sản xuất: **CTY TNHH MTV DƯỢC KHOA**
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
ĐC: 13 - 15 Phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84 4 39335956 * Fax: +84 4 39332607

KT: 47x26x72mm



Thành phần cho 01 lọ 8ml:
Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfate) 28000 IU
Dexamethasone Phosphat (dưới dạng Dexamethasone Natri phosphat) 8mg
Tà được vừa đủ 8ml

Chỉ định, Chống chỉ định, Thận trọng: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

Phân phối:
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC KHOA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Nhà phân phối: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAC VIỆT

Otivacin

THUỐC NHỎ MẮT, MŨI, TAI

Neomycin 28000 IU
Dexamethasone phosphat 8mg

(Rx)

Thuốc bán theo đơn

SDK:



8ml

Liều dùng:
- Dùng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi
- Ngày nhỏ 3 - 4 lần, cách nhau 3 - 4 giờ. Thời gian sử dụng không quá 7-10 ngày
* **Cách dùng:** Đổ ngược lọ thuốc, hướng đầu lọ vào mắt, hoặc mũi, hoặc tai để nhỏ, mỗi bên 1-2 giọt
Bảo quản: nơi khô ráo, trong lọ kín, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C
Số lô SX:
Ngày SX:
Hạn SD :

Otivacin

THUỐC NHỎ MẮT, MŨI, TAI

Neomycin 28000 IU
Dexamethasone phosphat 8mg

(Rx)

Thuốc bán theo đơn



8ml

LACVIETPHARM

Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAC VIỆT
ĐC: 37/2 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
ĐT Tư vấn: 09.73.72.86.86

Số lô SX:

Ngày SX :

Hạn SD :

Liều dùng, cách dùng, Chống chỉ định, Thận trọng:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: nơi khô ráo, trong lọ kín, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:
ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



PHÓ GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Trường Giang

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ THÊ DUYỆT
Lần đầu: 10/1/2013

THUỐC NHỎ MẮT, MŨI, TAI

Otivacin

■ THÀNH PHẦN: cho 01 lọ 8ml:

Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfate) 28000 IU
Dexamethasone Phosphat (dưới dạng Dexamethasone Natri phosphate) 8mg
Tá được: Acid citric, Natri citrate, Natri chloride, Thimerosal, Nước cất vừa đủ 8ml

■ DẠNG BẢO CHẾ: dung dịch thuốc nhỏ mắt, mũi, tai

■ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 01 lọ 8ml

■ DƯỢC LỰC HỌC

*Neomycin là kháng sinh nhóm aminoglycosid có cơ chế diệt khuẩn do ức chế quá trình sinh tổng hợp protein vi khuẩn. Phổ diệt khuẩn của Neomycin bao gồm các vi khuẩn hiếu khí Gram âm và các tụ cầu khuẩn, kể cả các chủng tạo penicillinase và kháng methicillin

*Dexamethason là fluomethyl prednisolon, glucocorticoid tổng hợp. Các glucocorticoid tác dụng bằng cách gắn kết vào thụ thể của tế bào, chuyển vị vào nhân tế bào và ở đó tác động đến một số gen được dịch mã. Các glucocorticoid cũng còn một số tác dụng trực tiếp, có thể không qua trung gian gắn kết vào thụ thể. Dexamethason có tác dụng chính của glucocorticoid là chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch

■ CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

*Dexamethason natri phosphat được hấp thu tốt ở ngay vị trí dùng thuốc và sau đó được phân bố vào tất cả các mô trong cơ thể. Thuốc qua nhau thai và một lượng nhỏ qua sữa.

*Neomycin được hấp thu tốt khi niêm mạc bị viêm và tổn thương. Khi được hấp thu, thuốc sẽ được thải trừ nhanh qua thận dưới dạng hoạt tính. Nửa đời của thuốc khoảng 2 - 3 giờ.

■ CÁC ĐẶC TÍNH TIỀN LÂM SÀNG:

Chưa có thông tin trong các tài liệu tìm được

■ CHỈ ĐỊNH

Dùng điều trị viêm nhiễm mắt, mũi, tai như viêm kết mạc, giác mạc, củng mạc, mống mắt, tuyến lệ, viêm mũi, viêm tai ngoài. Dùng trong chấn thương mắt, chống nhiễm trùng trước và sau phẫu thuật mắt.

■ LIỀU DÙNG

- Dùng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi
- Ngày nhỏ 3 - 4 lần, cách nhau 3 - 4 giờ. Thời gian sử dụng không quá 7-10 ngày

* Cách dùng:

Đốc ngược lọ thuốc, hướng đầu lọ vào mắt, hoặc mũi, hoặc tai để nhỏ, mỗi bên 1-2 giọt

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA THẦY THUỐC

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Loét giác mạc

Viêm mắt, mũi, tai có nguồn gốc do virus, do nấm

Bệnh nhân có tiền sử nấm mắt, lao mắt, glaucoma

Mẫn cảm với một hay nhiều thành phần của thuốc.

Tuyệt đối không dùng sau mổ lấy dị vật giác mạc

■ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Khi dùng dài ngày, dexamethason có thể dẫn đến glucomet, tổn thương thần kinh thị giác, đục thủy tinh thể, nguy cơ nhiễm nấm, tăng nguy cơ nhiễm trùng thứ phát làm chậm liền vết thương, che dấu các dấu hiệu nhiễm trùng hoặc làm nặng thêm các nhiễm trùng hiện có.

Thận trọng với người tăng huyết áp, bệnh tim, bệnh cường tuyến giáp.

Không dùng kéo dài liên tục, nếu dùng lâu dài phải có sự chỉ dẫn chuyên môn của bác sĩ.

Như các chế phẩm chứa corticoid khác, sử dụng lâu dài có nguy cơ gây bội nhiễm nấm, virus và nhiễm khuẩn

■ TƯƠNG TÁC THUỐC

Corticoid đối kháng tác dụng của các tác nhân gây hạ đường huyết (kể cả insulin), thuốc hạ huyết áp và thuốc lợi tiểu. Corticosteroid làm tăng tác dụng hạ kali huyết của acetazolamid, các thiazid lợi tiểu quai, carbenoxolon.

Hiệu lực của các dẫn chất coumarin chống đông máu có thể tăng khi dùng đồng thời với corticoid nên cần kiểm tra chặt chẽ thời gian prothrombin để tránh chảy máu tự phát. Neomycin có thể gây giảm hấp thu các thuốc khác như phenoxymethyl penicilin, digoxin. Dùng đồng thời với các thuốc lợi tiểu mạnh như acid ethacrynic, furosemid làm tăng khả năng gây độc với thận và thính giác. Neomycin có thể làm tăng tác dụng chống đông của coumarin bằng cách giảm dự trữ vitamin K. Dùng đồng thời neomycin với tác nhân ức chế thần kinh - cơ có thể làm tăng tác dụng ức chế thần kinh - cơ và dẫn đến liệt hô hấp. Do vậy, tránh dùng neomycin cho người bệnh đang dùng các thuốc này hoặc người bệnh bị nhược cơ

■ SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không nên dùng cho phụ nữ mang thai.

Thận trọng khi dùng với phụ nữ đang cho con bú.

■ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có báo cáo

■ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Có thể gây kích ứng tạm thời tại chỗ, nóng rát ở mũi, nhức đầu, khô niêm mạc mũi.

Có thể gây các phản ứng mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Có thể gây kích ứng tạm thời tại chỗ: Khó chịu, chảy nước mắt, nóng rát, xung huyết kết mạc.

Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

■ QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Triệu chứng tương tự như khi gặp tác dụng phụ của thuốc. Cần giảm liều hoặc ngưng thuốc nếu cần thiết

■ BẢO QUẢN: nơi khô ráo, trong lọ kín, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C

■ HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Lọ thuốc đã mở nắp không sử dụng quá 15 ngày

■ TIÊU CHUẨN: TCCS

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc

Nhà sản xuất: CTY TNHH MTV DƯỢC KHOA

- TRƯỞNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

ĐC: 13 - 15 Phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 4 39335955 * Fax: +84 4 39332607

Nhà phân phối: CTY TNHH DƯỢC PHẨM LẠC VIỆT

ĐC: 37/2 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

ĐT Tư vấn: 09.73.72.86.86