




MẪU NHÃN




1.- Mẫu nhãn trên tube



Số lô SX, HD
đóng nổi trên tuýp

2.- Mẫu hộp (Hộp 1 tuýp 10g):



3.- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:



PROMETHAZIN 2% KEM BÔI DA	
THÀNH PHẦN: Mỗi tuýp 10g chứa: • Hoạt chất chính: Promethazin hydroclorid.....0,2g • Tá dược: Nipagin, natri sulfít, propylen glycol, polawax, cetyl alcohol, glycerin, nước tinh khiết.	
CHỈ ĐỊNH: Các bệnh da do dị ứng: mề đay, ngứa, phát ban ở da do có nguồn gốc dị ứng, vết đốt của côn trùng, phỏng nhẹ bề mặt.	
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Các bệnh da có nhiễm trùng hay dễ kích ứng, eczéma, các tổn thương có rỉ nước.	
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG: THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA THẦY THUỐC • Thoa thuốc 3 - 4 lần/ngày. • Ngưng sử dụng thuốc nếu: sau 1 tuần dùng thuốc mà không thấy giảm các triệu chứng ngứa. Nên tham vấn bác sỹ để có hướng xử lý tiếp theo.	
Chú ý: • Dùng đầu nhọn ở nắp ngoài để mở đầu tuýp • Vặn chặt nắp sau khi dùng.	
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Hiếm khi gây mẫn cảm ở da hay mẫn cảm với ánh sáng.	
Ghi chú: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.	
THẬN TRỌNG: • Ngứa chỉ là một triệu chứng. Trong mọi trường hợp cần tìm cho ra nguyên nhân để điều trị. • Không được dùng các thuốc kháng histamin cho trẻ đẻ non hoặc sơ sinh vì nhóm này thường rất dễ nhạy cảm với tác dụng ức chế hô hấp và kháng cholinergic ở thần kinh trung ương của thuốc. • Các thuốc này cũng tránh dùng cho trẻ em có dấu hiệu và biểu hiện của hội chứng Reye, đặc biệt là khi dùng liều cao vì có thể gây ra các triệu chứng ngoại tháp dễ lẫn với các dấu hiệu thần kinh trung ương của hội chứng này, do đó gây khó khăn cho chẩn đoán. • Phụ nữ mang thai: Chỉ nên dùng promethazin cho người có thai khi mà lợi ích điều trị xác đáng hơn nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi. • Phụ nữ nuôi con bú: Do không biết thuốc có phân bố vào sữa mẹ hay không, nên thận trọng khi dùng cho người đang cho con bú. Các thuốc kháng histamin có thể ức chế tiết sữa do tác dụng kháng cholinergic.	
TƯƠNG TÁC THUỐC: (chưa có tài liệu)	
QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ: Báo ngay cho bác sỹ khi dùng quá liều chỉ định.	
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Tuýp 10g - Hộp 1 tuýp	
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Nút kín, tránh va chạm mạnh.	
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất (chưa mở thuốc).	
TIÊU CHUẨN: TCCS	
CHÚ Ý: Không sử dụng thuốc nếu: • Thuốc bị biến màu, biến dạng. • Tuýp bị nứt, thủng hay rò rỉ. • Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sỹ khi gặp những triệu chứng dị ứng. • Để xa tầm tay trẻ em. • Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. • Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.	
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM ĐT: (08) - 38440106 Fax: (84 - 8) - 38440446 Nhà máy sản xuất: Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương




PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

