

ĐS. PHAN TÙNG CHÂU

MẪU NHÃN SÉNÉ-SAGOPHA

1. MẪU NHÃN HỘP 1 CHAI 50 VIÊN



2. MẪU NHÃN CHAI 50 VIÊN



Tp. HCM, ngày 16 tháng 9 năm 2013
Công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn



DS. PHAN TÙNG CHÂU

MẪU NHÃN SÉNÉ-SAGOPHA

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SÉNÉ-SAGOPHA

WHO-GMP

Cao Phan tả điệp

CÔNG THỨC

Mỗi viên bao phim chứa:

- Hoạt chất: 70 mg cao Phan tả điệp (*Sennae folii extractum siccum normatum*) tương ứng với 8,6 mg sennosid B
- Tá dược: Tinh bột ngô, Lactose monohydrat, Magnesi stearat, HPMC, PEG 6000, Bột talc, Sắt oxyd.

CHỈ ĐỊNH

- Dùng trong các trường hợp táo bón ở người cao tuổi, phụ nữ sau khi sinh, táo bón ở trẻ em, táo bón do thuốc, táo bón ở người bị bệnh tim, táo bón sau phẫu thuật hậu môn, trực tràng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Tuổi	Liều khởi đầu	Liều tối đa
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi	Ngày uống 1 lần, mỗi lần 2 viên	Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên
Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi	Ngày uống 1 lần, mỗi lần 1 viên	Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên
Trẻ em từ 2 đến 6 tuổi	Ngày uống 1 lần, mỗi lần ½ viên	Ngày uống 2 lần, mỗi lần ½ viên
Người cao tuổi	Sử dụng liều khởi đầu bằng nửa liều kê toa thông thường.	

- Nên uống thuốc vào buổi tối trước khi đi ngủ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không được dùng thuốc trong các trường hợp sau:

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Tắc ruột, viêm ruột cấp, viêm ruột thừa, đau bụng không rõ nguyên nhân.
- Phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú.
- Trẻ em dưới 2 tuổi.

THẬN TRỌNG

- Không dùng thuốc kéo dài quá 1 tuần nếu không có chỉ định của bác sĩ.
- Không đại tiện được sau khi dùng thuốc phải ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ.
- Phụ nữ đang thời kỳ kinh nguyệt.

TƯƠNG TÁC THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC

Nguy cơ cao:

- Licorice (Cam thảo): Sử dụng đồng thời cam thảo với phan tả điệp có thể dẫn đến tăng nguy cơ hạ kali huyết. Nên tránh dùng chung hai thành phần trên.

Nguy cơ trung bình:

- Digoxin: Sử dụng đồng thời digoxin với phan tả điệp có thể dẫn đến tăng nguy cơ độc tính của digoxin. Những bệnh nhân đang dùng digoxin phải được khuyến cáo tránh dùng đồng thời với phan tả điệp. Nếu độc tính của digoxin xảy ra phải ngưng sử dụng Phan tả điệp đồng thời theo dõi và bổ sung kali nếu cần.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Dùng đúng liều thường không xảy ra tác dụng không mong muốn.
- Khi dùng quá liều có thể xảy ra co thắt ruột - dạ dày.
- Rất ít trường hợp khi dùng thuốc kéo dài có thể gây ra chứng rối loạn nhịp tim, chứng phù.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC

- Sennosid trong cao phan tả điệp là một anthranosid nhuận trường kích thích. Tác dụng nhuận trường là do hoạt động của những sennosid và chất chuyển hóa có hoạt tính của chúng ở trong đại tràng. Tác dụng nhuận tràng này được thực hiện bởi sự ức chế hấp thu của nước và chất điện giải từ đại tràng, do đó làm tăng áp suất và thể tích những chất trong đại tràng. Điều này sẽ kích thích nhu động đại tràng dẫn đến việc đại tiện.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

- Hấp thu: thuốc được hấp thu một lượng nhỏ khi dùng đường uống.
- Khi dùng đường uống tác dụng nhuận trường thường đạt được sau 6-12 giờ.
- Phân bố: việc phân bố không được mô tả đầy đủ; thuốc được hấp thu có thể được phân bố vào mắt, nước bọt và niêm mạc đại tràng.
- Chuyển hóa: Thuốc hấp thu được chuyển hóa ở gan, phần thuốc không hấp thu được thủy phân do men vi khuẩn ở đại tràng.
- Thải trừ: Thuốc và chất chuyển hóa được bài tiết trong mật, nước tiểu và thải trừ qua phân.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

- Trong trường hợp quá liều phải đến ngay cơ sở y tế và theo hướng dẫn của bác sĩ.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI

- Hộp 5 vỉ x 10 viên.
- Hộp 1 chai x 50 viên.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

- Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

NHÀ SẢN XUẤT:



CTY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN
SAGOPHA

Sản xuất tại: 27 Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An-Bình Dương

Tp. HCM, ngày 18 tháng 9 năm 2013

Công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn

SAGOPHA
GIAM ĐỐC

PHÓ CỤC TRƯỞNG DS. PHAN TÙNG CHÂU

Nguyễn Văn Thanh