

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

<https://trungtamthuoc.com/>
182/0748

Ngày: 8/12/2014

10001

Siro
Bổ Phổi

GMP - WHO

GMP - WHO 100ml

Siro
Bổ Phổi

NHUẬN PHẾ - GIẢM HO

Công thức: (Cho 1 lọ 100ml)
- Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ:
Mạch môn 5,00g
Bách bộ 5,00g
Cam thảo 1,10g
Trần bì 1,70g
Bọ mấu 12,00g
Cát cánh 1,10g
- Menthol 0,02g
- Tinh dầu bạc hà 0,02ml
- Tá dược vừa đủ 100 ml
Tác dụng: Nhuận phế, giảm ho.
Chỉ định: Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày đờm đặc, rát cổ, ráo phổi.
SĐK:

Chống chỉ định: Xem đơn hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Cách dùng - Liều dùng:
Người lớn: Ngày uống 50ml, chia làm 2 - 3 lần.
Trẻ em trên 30 tháng tuổi: Ngày uống 30ml, chia làm 2 - 3 lần.
Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS.
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

GMP - WHO 100ml Siro Bổ Phổi NHUẬN PHẾ - GIẢM HO	Công thức: (Cho 1 lọ 100ml) - Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ: Mạch môn 5,00g Bách bộ 5,00g Cam thảo 1,10g Trần bì 1,70g Bọ mấu 12,00g Cát cánh 1,10g - Menthol 0,02g - Tinh dầu bạc hà 0,02ml - Tá dược vừa đủ 100 ml Tác dụng Nhuận phế giảm ho. Chỉ định: Các chứng ho gió, ho lâu ngày đờm đặc, rát cổ, ráo phổi.	GMP - WHO 100ml Siro Bổ Phổi NHUẬN PHẾ - GIẢM HO	Cách dùng - Liều dùng: Người lớn: Ngày uống 50ml, chia làm 2 - 3 lần. Trẻ em trên 30 tháng tuổi: Ngày uống 30ml, chia làm 2 - 3 lần. Chống chỉ định: Xem đơn hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. Tiêu chuẩn: TCCS. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SĐK: Số lô SX: Ngày SX: HD:
KHAIHAPHARCO	CÔNG TY CPTM DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ Số 3A, Phố Lý Sơn, P. Tân Phong, T. Thái Bình Tel: 036 3641548-036 3641549 Fax: 036 3641548	KHAIHAPHARCO	Barcode

KT: 46x46x16 mm



Thái Bình, ngày tháng năm 2014
CÔNG TY CPTM DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Nguyễn Hồng Ngọc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**GMP-WHO****SIRO BỔ PHỔI****1. Dạng bào chế:** Siro.**2. Thành phần cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất:** Cho 1 lọ 100 ml

Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ:

STT	Thành phần (INN)	Hàm lượng
1	Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ:	
	Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis japonici</i>)	5,00 gam
	Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	5,00 gam
	Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	1,10 gam
	Bọ mắm (<i>Herba Pouzolziae zeylanicae</i>)	12,00 gam
	Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,10 gam
	Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	1,70 gam
2	Menthol (<i>Mentholum</i>)	0,02 gam
3	Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae</i>)	0,02 ml
4	Ethanol 96% (<i>Ethanolum 96%</i>)	5,00 ml
5	Acid benzoic (<i>Acidum benzoicum</i>)	0,20 gam
6	Đường trắng (<i>Saccharum</i>)	90,00 gam
7	Nước uống được (<i>Aqua Potabilis</i>)	100,00 ml

3. Công dụng - chỉ định:**- Công dụng:** Nhuận phế, giảm ho.**- Chỉ định:**

Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày đờm đặc, rát cổ, ráo phổi.

4. Chống chỉ định - thận trọng:**Chống chỉ định:**

- Phụ nữ có thai và đang cho con bú.
- Người tiểu đường.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng:

Tuy thuốc không độc nhưng không nên dùng quá liều quy định.

5. Tác dụng không mong muốn: Hiện chưa thấy tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu có hiện tượng bất thường khi dùng thuốc cần ngừng sử dụng và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý.**6. Cách dùng - liều dùng:**

- Người lớn: Ngày uống 50 ml, chia làm 2 đến 3 lần.
- Trẻ em trên 30 tháng tuổi: Ngày uống 30 ml chia làm 2 đến 3 lần.

7. Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc:

Khi đang dùng thuốc cần kiêng các chất lạnh: Không nên ăn rau má, diếp cá, củ cải trắng, đồ biển như: ốc, sò, nghêu,... Không uống nước đá và tắm nước lạnh khi dùng thuốc.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa phát hiện thấy tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khác.

11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều chỉ định nếu thấy hiện tượng bất thường cần ngừng sử dụng và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý kịp thời.

12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. Hạn dùng sau khi mở nắp: 7 ngày kể từ khi mở nắp.

14. Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

15. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

16. Trình bày: Hộp 1 lọ x 100 ml và 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Địa chỉ: Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363 641 546 Fax: 0363 641 548

Tư vấn sử dụng: 0363 647 286



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng



Thái Bình, ngày tháng năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Nguyễn Hồng Ngọc