

Rx

THUỐC KÊ ĐƠN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thuốc viên nén

Spalaxin

Alverin (Alverin citrat) 40 mg

**ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC.**

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén có chứa:

Alverin citrat (tính theo dạng base).....40mg

Tá dược vừa đủ cho 1 viên nén

(Tinh bột bắp, povidon, sodium starch glycolat, silicon dioxit, lactose, bột talc, magnesi stearat, ethanol 96°).

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các triệu chứng đau do rối loạn chức năng đường tiêu hóa và đường mật.

Điều trị các triệu chứng đau hay co thắt vùng tiết niệu, sinh dục (đau bụng kinh, đau khi sinh, đau quận thận và đau đường niệu).

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:

Dùng uống.

Người lớn: 1 – 3 viên/lần, 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân nhạy cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ cho con bú không nên dùng.

Bệnh nhân bị tắc nghẽn ruột, hay liệt ruột.

THẬN TRỌNG:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Không nên dùng khi có thai và cho con bú.

Bệnh nhân bị liệt ruột cần thông báo cho thấy thuốc.

Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chưa có báo cáo ghi nhận tác động độc hại nào của Spalaxin đối với thai nhi. Phải hỏi ý kiến bác sỹ trước khi bắt đầu điều trị.

Spalaxin không được khuyến cáo sử dụng đối với phụ nữ cho con bú do chưa có công trình nghiên cứu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Spalaxin có thể gây chóng mặt. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, không lái xe hoặc tham gia bất kỳ hoạt động vận hành máy móc nào khác.

Spalaxin cũng có thể gây buồn nôn, nhức đầu, ngứa, nổi mẩn.

Hiếm: Phù thanh quản, sốc phản vệ, tổn thương gan (giảm dần lúc ngưng thuốc).

Spalaxin có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Tham khảo ý kiến bác sỹ nếu bạn có vấn đề bất thường khi dùng thuốc này.

Thông báo cho Bác Sỹ hoặc Dược Sỹ biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Có thể gây hạ huyết áp, gây ra những triệu chứng giống như khi ngộ độc atropin.

Áp dụng các biện pháp điều trị hỗ trợ khi bệnh nhân có dấu hiệu hạ huyết áp và xử trí giống như khi ngộ độc atropin.

Chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất khi có dấu hiệu quá liều.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

Spalaxin là thuốc chống co thắt cơ trơn, tác dụng trực tiếp trên sợi cơ trơn. Do không có tác dụng kiểu atropin, Spalaxin có thể sử dụng trong trường hợp tăng nhãn áp hoặc phì đại tuyến tiền liệt.

Spalaxin được hấp thu sau khi uống và chuyển hóa nhanh thành chất chuyển hóa có hoạt tính, đạt được nồng độ đỉnh trong máu 1-1,5 giờ sau khi uống.

ĐÓNG GÓI:

Vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ; chai 200 viên, chai 500 viên.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

www.spm.com.vn

Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam.

ĐT: (028) 37507496 - Fax: (028) 38771010