

Lần đầu: 12 / 8 / 2014

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội





Hướng dẫn sử dụng thuốc:
Thuốc bán theo đơn.
TARVICORT-N

Dạng thuốc: Kem

Thành phần: Mỗi tuýp (15g) kem chứa:

Fluocinolon acetonid	3,75mg
Neomycin sulfat	75mg
(tương ứng Neomycin 51000IU)	
Tá dược vđ	1 tuýp

(Tá dược gồm: Cetostearyl alcohol, cremophor, propylen glycol, acid stearic, parafin, ethanol 90⁰, nước tinh khiết).

Các đặc tính dược lực học:

Fluocinolon acetonid: Là một corticosteroid tổng hợp có nguyên tử fluor gắn vào nhân steroid. Cơ chế tác dụng của các corticosteroid dùng tại chỗ là do phối hợp 3 tính chất quan trọng: chống viêm, chống ngứa và tác dụng co mạch.

Neomycin sulfat: Có tác dụng phần lớn các vi khuẩn gram âm và gram dương gây nên các nhiễm khuẩn ngoài da.

Các đặc tính dược động học: Thuốc hấp thu tốt qua da.

Chỉ định:

- Nhiễm khuẩn ngoài da.
- Eczema: Eczema tiết bã, eczema hình đĩa, eczema dị ứng.
- Viêm da: viêm da dị ứng, viêm da tiếp xúc, viêm da thần kinh.
- Vảy nến (trừ dạng vảy nến lan rộng).
- Liken phẳng, luput ban đỏ hình đĩa, ngứa sẩn.

Cách dùng và liều lượng: Bôi lên vùng da bị bệnh một lớp mỏng, trong trường hợp cấp tính thường thoa 3 lần mỗi ngày, mỗi lần cách nhau 6 giờ. Trong trường hợp viêm da mãn tính chỉ cần thoa 1 lần trong ngày là đủ. Thuốc chứa loại Corticosteroid mạnh nhất và chỉ nên thoa một lớp rất mỏng.

(Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc).

Chống chỉ định: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Trứng cá đỏ, nhiễm khuẩn ở da do vi khuẩn, nấm hoặc virus (Herpes, Thủy đậu), hăm bẹn.

Thận trọng: Không dùng thuốc thường xuyên, bôi trên diện rộng, hoặc dùng trong thời gian dài hoặc băng kín chỗ bôi thuốc vì có nguy cơ tăng tác dụng phụ toàn thân và các phản ứng phụ tại chỗ. Những người bị vảy nến cần được theo dõi cẩn thận vì bệnh có thể nặng lên hoặc tạo vảy nến có mủ.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Khi cần thiết dùng cho người mang thai, nên dùng với liều thấp nhất. Không nên bôi thuốc lên vú mẹ trước khi cho trẻ bú. Khi cần điều trị cho người cho con bú, bôi một lượng tối thiểu cần thiết và trong thời gian ngắn nhất.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Thỉnh thoảng có gặp các phản ứng như mẫn cảm hoặc kích ứng ở chỗ bôi thuốc: Kích ứng, vết rạn, viêm da, nhiễm khuẩn thứ phát, rát sần, trứng cá đỏ, ngứa.

*** Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.

Quá liều- xử trí: Chưa có tài liệu báo cáo. Không có hiện tượng quá liều hay ngộ độc khi bôi thuốc ngoài da.

Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* Lưu ý: Khi thấy thuốc có biểu hiện tách lớp, không dính vào da, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ... hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

Qui cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x15g

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30⁰C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM.

*"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"*

THUỐC SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khê - Hà Đông - T.P Hà Nội

ĐT: 043.3522203-3516101. FAX: 0433.522208

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

