

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/1/6.....1.2021/1

nh

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

R_x Thuốc bán
theo đơn

VacoNisidin®

Nefopam hydroclorid 30mg



10 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN

Nefopam hydroclorid 30 mg

Tá dược v.d 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quận thận, đau do bướu ung thư.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO

GMP
WHO



R_x Thuốc bán
theo đơn

VacoNisidin®

Nefopam hydroclorid 30mg



10 vỉ x 10 viên nang cứng



Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg



Hộp 20 vỉ x 10 viên nang cứng

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

Rx Thuốc bán
theo đơn

VacoNisidin®

Nefopam hydroclorid 30mg



20 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN

Nefopam hydroclorid 30 mg

Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quặn thận, đau do buồn ung thư.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP
WHO

Rx Thuốc bán
theo đơn

VacoNisidin®

Nefopam hydroclorid 30mg



20 vỉ x 10 viên nang cứng



Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1854, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg



Hộp 50 vỉ x 10 viên nang cứng

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

R_x Thuốc bán
theo đơn

VacoNisidin®

Nefopam hydroclorid 30mg



50 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN

Nefopam hydroclorid 30 mg
Tá dược v.d 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quặn thận, đau do bướu ung thư.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

**GMP
WHO**

R_x Thuốc bán
theo đơn

VacoNisidin®

Nefopam hydroclorid 30mg



50 vỉ x 10 viên nang cứng



Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Địa chỉ nhà máy: km 1854, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg



Hộp 100 vỉ x 10 viên nang cứng

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

R_x Thuốc bán
theo đơn

VacoNisidin®

Nefopam hydroclorid 30mg



100 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN

Nefopam hydroclorid 30 mg

Tá được v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quần thần, đau do buồn ung thư.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP
WHO


R_x Thuốc bán
theo đơn

VacoNisidin®

Nefopam hydroclorid 30mg



100 vỉ x 10 viên nang cứng



Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg



Hộp 5 vỉ x 20 viên nang cứng

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

5 vỉ x 20 viên nang cứng

THÀNH PHẦN
Nefopam hydroclorid 30 mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quận thận, đau do bướu ung thư.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên ngày 3 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật.
Người bệnh đang dùng IMAO

GMP WHO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
M.S.D.N. 1100112319 - C.T.C.P
TP. TÂN AN - T. LONG AN

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

5 vỉ x 20 viên nang cứng

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
M.S.D.N. 1100112319 - C.T.C.P
TP. TÂN AN - T. LONG AN

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

5 vỉ x 20 viên nang cứng

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3 829 311 • Fax: (072) 3 822 244
Địa chỉ nhà máy: km 1854, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hộp 10 vỉ x 20 viên nang cứng

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

Rx Thuốc bán
theo đơn

VacoNisidin®

Nefopam hydroclorid 30mg



10 vỉ x 20 viên nang cứng

THÀNH PHẦN

Nefopam hydroclorid 30 mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quặn thận, đau do bấu ung thư.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP
WHO


Rx Thuốc bán
theo đơn

VacoNisidin®

Nefopam hydroclorid 30mg



10 vỉ x 20 viên nang cứng



Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg



Hộp 25 vỉ x 20 viên nang cứng

VacoNisidin[®]
Nefopam hydroclorid 30mg

Thuốc bán theo đơn

25 vỉ x 20 viên nang cứng



THÀNH PHẦN
Nefopam hydroclorid 30 mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quận thận, đau do bướu ung thư.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật.
Người bệnh đang dùng IMAO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP
WHO

VacoNisidin[®]
Nefopam hydroclorid 30mg

Thuốc bán theo đơn

25 vỉ x 20 viên nang cứng



VacoNisidin[®]
Nefopam hydroclorid 30mg


Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Hộp 50 vỉ x 20 viên nang cứng

VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

Thuốc bán theo đơn

50 vỉ x 20 viên nang cứng



THÀNH PHẦN
Nefopam hydroclorid 30 mg
Tá dược v.d 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quận thận, đau do bướu ung thư.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật.
Người bệnh đang dùng IMAO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP WHO



VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

Thuốc bán theo đơn

50 vỉ x 20 viên nang cứng



Vacopharm
Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3 829 311 • Fax: (072) 3 822 244
Địa chỉ nhà máy: km 1854, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



VacoNisidin®
Nefopam hydroclorid 30mg

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 100 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Nefopam hydroclorid 30 mg Tá được v.đ 1 viên nang cứng CHỈ ĐỊNH: VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quặn thận, đau do buồn ung thư. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO	 VacoNisidin® Nefopam hydroclorid 30mg		Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C SDK : TC áp dụng: TCCS Số lô SX : Ngày SX : HD : Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
--	---	---	--

Nhãn chai 200 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Nefopam hydroclorid 30 mg Tá được v.đ 1 viên nang cứng CHỈ ĐỊNH: VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quặn thận, đau do buồn ung thư. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO	 VacoNisidin® Nefopam hydroclorid 30mg		Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C SDK : TC áp dụng: TCCS Số lô SX : Ngày SX : HD : Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
--	---	---	--

Nhãn chai 250 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Nefopam hydroclorid 30 mg Tá được v.đ 1 viên nang cứng CHỈ ĐỊNH: VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quặn thận, đau do buồn ung thư. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO	 VacoNisidin® Nefopam hydroclorid 30mg		Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C SDK : TC áp dụng: TCCS Số lô SX : Ngày SX : HD : Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
--	---	---	--

Nhãn chai 500 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Nefopam hydroclorid 30 mg Tá được v.đ 1 viên nang cứng CHỈ ĐỊNH: VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quặn thận, đau do buồn ung thư. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO	 VacoNisidin® Nefopam hydroclorid 30mg		Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C SDK : TC áp dụng: TCCS Số lô SX : Ngày SX : HD : Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
--	---	---	--

Nhãn chai 1000 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Nefopam hydroclorid 30 mg Tá được v.đ 1 viên nang cứng CHỈ ĐỊNH: VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quặn thận, đau do buồn ung thư. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO	 VacoNisidin® Nefopam hydroclorid 30mg		Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C SDK : TC áp dụng: TCCS Số lô SX : Ngày SX : HD : Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
--	---	---	--

Tờ hướng dẫn dùng thuốc**R_x Thuốc bán theo đơn****VIÊN NANG CỨNG VACONISIDIN****Thành phần**

Nefopam hydroclorid

30 mg

Tá dược v.đ

1 viên nang cứng

(Tinh bột sắn, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Natri lauryl sulfat, Tween 80, Magnesi stearat, Microcrystallin cellulose 101, Acid stearic)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 02 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 05 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
8	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ
9	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ
10	Đóng chai 100 viên
11	Đóng chai 200 viên
12	Đóng chai 250 viên
13	Đóng chai 500 viên
14	Đóng chai 1000 viên

Dược lực học

Nefopam có tác dụng giảm đau trên thần kinh trung ương. Nefopam có tác dụng kháng muscarinic và thần kinh giao cảm.

Dược động học

Nefopam được hấp thu qua đường tiêu hóa. Tập trung cao trong huyết tương sau khi uống 1-3 giờ. Khoảng 73% liên kết với protein huyết tương. Nefopam được phân bố vào sữa mẹ. Thời gian bán thải của Nefopam khoảng 4 giờ. Nefopam được chuyển hóa nhanh và bài tiết chủ yếu qua đường tiểu, trong đó có 5% được bài tiết dưới dạng không chuyển hóa, khoảng 8% được bài tiết qua phân.

Chỉ định

VacoNisidin được chỉ định trong các cơn đau cấp tính và mãn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt, đau răng, đau bụng kinh, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, viêm tụy mãn tính, cơn đau sỏi mật, cơn đau quặn thận, đau do bướu ung thư.

Liều dùng và cách dùng: dùng đường uống

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định

Trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử bị các cơn co giật. Người bệnh đang dùng IMAO

Thận trọng: người già, tăng nhãn áp, bị ứ đọng nước tiểu, người suy gan, suy thận.

Phụ nữ có thai và cho con bú: thận trọng khi sử dụng, cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ.

Người lái xe và vận hành máy móc: thận trọng vì thuốc có thể gây buồn ngủ.

Tác dụng không mong muốn

Rối loạn đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đồ mồ hôi, buồn ngủ, mất ngủ, bí tiểu, chóng mặt, hạ huyết áp, run, dị cảm, đánh trống ngực, căng thẳng, nhảm lẫn, nhìn mờ, nhức đầu, khô miệng, ngứa, phù mạch, phản ứng dị ứng và nhịp tim nhanh. Ít gặp: sáng khoái, ảo giác, co giật và nước tiểu màu hồng.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Các phản ứng phụ có thể gia tăng khi dùng đồng thời với các nhóm thuốc:

Thuốc cường giao cảm và kháng tiết cholin.

Thuốc chống co thắt có tác động giống Atropin.

Thuốc trị bệnh Parkinson có tác động kháng tiết cholin.

Thuốc chống trầm cảm nhóm Imipramin và thuốc chống trầm cảm 3 vòng.

Kháng Histamin H₁ và chất Disopyramide.

Quá liều và xử trí: chưa có báo cáo. Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TC áp dụng: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hưng

Long An, ngày 01 tháng 11 năm 2013

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thư