

Chauk

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 24/9/2012

90 x 65 x 32 mm

DK PHARMA

5 vỉ x 12 viên

Vimate

Viên nén bao phim

THUỐC THẢO DƯỢC CHỮA CÁC CHỨNG
TÊ THẤP - ĐAU NHỨC - SÚNG KHỚP

- ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
- BẢO QUẢN THUỐC NƠI KHÔ MÁT
- ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY TRẺ EM

- **Thành phần:** mỗi viên nén bao phim chứa:
Mã tiền chế (*Phedonox Myrtilol praparat*) 50 mg
Thương huyết (*Rhizoma Atractylodes*) 20 mg
Hương phụ tử chế (*Rhizoma cyprip praparat*) 13 mg
Mộc hương (*Radix Saussurea japonica*) 8 mg
Địa liên (*Rhizoma Ranunculaceae galanga*) 6 mg
Quế chi (*Racemosa Cinnamomi*) 3 mg
- **Chỉ định:**
Chữa các chứng tê thấp, đau nhức, sưng khớp.
- **Chống chỉ định:**
Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi.
Người đang sốt cao.
Người phong thấp thể nhiệt.

■ Tiêu chuẩn: TCCS

DK PHARMA

5 vỉ x 12 viên

Vimate

Viên nén bao phim

THUỐC THẢO DƯỢC CHỮA CÁC CHỨNG
TÊ THẤP - ĐAU NHỨC - SÚNG KHỚP



CÔNG TY DƯỢC KHOA - DK PHARMA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
13 - 15 LÊ THÁNH TỔNG

- **Liều dùng:**
Người lớn: 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày.
Trẻ em 5-15 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
Uống sau bữa ăn.
Không dùng quá liều chỉ định
- **SDK:**
- **Số lô:**
- **HSD:**
- **NSX:**
- Mọi thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng



GIÁM ĐỐC

Trần Văn

Tờ hướng dẫn sử dụng

Vimate

Viên nén bao phim

Vimate là thuốc phong thấp hoàn toàn từ thảo dược, chủ trị các chứng tê thấp, đau nhức, sưng khớp. Bài thuốc này đã được các thầy thuốc sưu tầm trong những bộ sách nổi tiếng: *Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam* (GS. Đỗ Tất Lợi), *Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam* (Viện Dược liệu).

- **Mô tả sản phẩm:** Viên nén bao phim, màu hồng, vị đắng.
- **Quy cách đóng gói:** Hộp 5 vỉ x 12 viên.
- **Thành phần, hàm lượng của thuốc:**

Mỗi viên nén bao phim có chứa:

Mã tiền chế (<i>Pulveres Strychni praeparata</i>)	50 mg
Thương truật (<i>Rhizoma Atractylodis</i>)	20 mg
Hương phụ tứ chế (<i>Rhizoma cyperi praeparata</i>)	13 mg
Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>)	08 mg
Địa liên (<i>Rhizoma Kaempferiae galangae</i>)	06 mg
Quế chi (<i>Ramunlus Cinnamomi</i>)	03 mg

Tá dược: Tinh bột, lactose, talc, magnesi stearat, HPMC, PEG 4000, titan dioxit, màu erythrosine lake.

- **Chỉ định:** Chữa các chứng tê thấp, đau nhức, sưng khớp.
- **Cách dùng, liều dùng:**
 - Uống thuốc sau bữa ăn.
 - Người lớn: uống ngày 2 lần x 2 viên/lần hoặc ngày 3 lần x 1 viên/lần.
 - Trẻ em từ 5 – 15 tuổi: uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên.
- **Chống chỉ định:**

Không dùng cho phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người đang sốt cao.
Người phong thấp thể nhiệt
- **Tác dụng không mong muốn:**

Có thể có cảm giác nôn nao, khó chịu. Các triệu chứng trên sẽ giảm nếu uống thuốc ngay sau bữa ăn và sẽ hết khi ngừng thuốc.
- **Tương tác thuốc:** chưa phát hiện thấy tương tác của thuốc với các thuốc khác.



Foil nhôm rộng 200 mm

llb



200.00 millimeters



GIÁM ĐỐC
TS. Trần Văn Ôn

