



PM Specification			
Job Name	: Xinc 100 mL Carton (Vietnam)	Paper	: 300 gsm Swedish Board
Size	: L- 4.4 cm, W- 4.4 cm, H- 10.3 cm	Lamination	: Varnish
Print	: 4 Colors	Loading Process	: Top Loading
Pantone Code:	PANTONE Process Black C PANTONE Process Blue C PANTONE 361 C PANTONE Reflex Blue C PANTONE 165 C PANTONE Reflex Blue C	Others	:

Xinc zinc syrup

MÔ TẢ

XINC SIRUP cung cấp kẽm sulfate dạng monohydrat, đây là một nguyên tố vi lượng thiết yếu có tham gia vào hệ thống enzym của cơ thể. Cơ thể cần có kẽm để tăng trưởng và để duy trì sức khỏe. Kẽm rất quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển, sự trưởng thành về tinh dục và sinh sản, thích ứng với việc nhìn trong bóng tối, khứu giác và vị giác, lưu trữ insulin và cung cấp cho hệ thống miễn dịch. Thiếu kẽm có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch, chậm lành vết thương, giảm vị khả năng vị giác và khứu giác, giảm khả năng tự kháng khuẩn, tầm nhìn kém về đêm, tăng nguy cơ sảy thai, rụng tóc, hôn mê tâm thần, thay đổi về da, cơ quan sinh sản kém phát triển.

CHỈ ĐỊNH

Bổ sung kẽm bằng đường uống được chỉ định trong trường hợp thiếu kẽm và/hoặc mất kẽm. Thiếu kẽm có thể là do chế độ ăn hoặc cơ thể kém hấp thu, mất quá nhiều kẽm xảy ra ở các trường hợp bị trăn thương, bỏng, tiêu chảy và cơ thể mất protein. Nên bổ sung kẽm đến khi các triệu chứng lâm sàng được cải thiện nhưng cũng có thể phải tiếp tục với các trường hợp kém hấp thu nặng, bệnh chuyển hóa hoặc trong trạng thái bị mất kẽm.

LIỀU LƯỢNG VÀ ĐƯỜNG DÙNG

Trẻ em dưới 10kg: 2 thìa cafe mỗi ngày sau ăn
Trẻ em từ 10-30kg: 2 thìa cafe 1-3 lần mỗi ngày sau ăn.
Người lớn và trẻ em trên 30kg: 4 thìa cafe, 1-3 lần mỗi ngày sau ăn.
Thuốc có hiệu quả nhất khi uống 1 giờ trước ăn hoặc 2 giờ sau ăn. Tuy nhiên nếu thuốc gây khó chịu trong dạ dày, bạn có thể uống thuốc trong bữa ăn. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, nên dùng thuốc thường xuyên. Với dạng siro, lưu ý lắc trước khi uống

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định với các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG

Trong trường hợp suy thận có thể xảy ra tích lũy kẽm cấp tính, nên điều chỉnh liều trong trường hợp này.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Dùng đồng thời kẽm và tetracycline có thể làm giảm sự hấp thu của tetracycline và kẽm. Tương tự như vậy khi dùng đồng thời kẽm với các quinolon cũng có thể làm giảm sự hấp thu của cả hai. Dùng đồng thời kẽm với penicilamin có thể làm giảm hấp thu kẽm.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa xác định được an toàn và hiệu quả của thuốc với phụ nữ đang mang thai.

Kẽm qua được nhau thai và xuất hiện trong sữa mẹ.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc trên khả năng lái xe và vận hành máy móc được thực hiện.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Kẽm có thể gây ra buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, ợ nóng, viêm dạ dày.

QUÁ LIỀU

Các biểu hiện của quá liều như buồn nôn, nôn, chóng mặt, ngất xỉu và khó thở. Nếu nghi ngờ đã dùng quá liều, bạn hãy liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát chất độc hoặc phòng cấp cứu địa phương.

HẠN DÙNG

48 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng, bảo quản dưới 30°C.

Để thuốc xa tầm với của trẻ em.

ĐÓNG GÓI

Xinc syrup: Hộp 1 Lọ chứa 100/200 ml siro. Mỗi 5 ml siro chứa kẽm sulfate monohydrate USP tương đương với 10mg kẽm nguyên tố.

Sản xuất bởi

ESKAYEF BANGLADESH LIMITED
BANGLADESH

Chủ sở hữu giấy phép sản phẩm tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH MEDFATOP

Số 34C đường 22, quận 23, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Tân Bình, TP HCM, Việt Nam



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Vân Hạnh