

TOMIKAN®

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TMK 30062020

Thành phần: (cho một viên nén bao phim) 504mg cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương: Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 1050mg, Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 630mg, Đỗ trọng (*Cortex Eucommiae*) 630mg, Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 315mg, Nhân sâm (*Radix Ginseng*) 840mg, Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*) 630mg, Câu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 630mg, Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*) 315mg.

Tá dược: Tinh bột sắn, Manitol, Aerosil, Povidon K30, Magnesi stearate, Iron oxide brown, Titan dioxide, Hydroxypropylmethyl cellulose 5cps, Polyethylenglycol 6000, Talc, Acid benzoic vừa đủ 1 viên.

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Tác dụng: Bổ thận, tráng dương, sinh tinh, tăng cường sức khỏe.

Chỉ định: Bồi bổ cơ thể. Hỗ trợ điều trị các chứng thận dương suy, lãnh cảm, di tinh, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, đau lưng, mỏi gối, cơ thể suy nhược, kém ăn, ít ngủ, tóc bạc sớm, tai ù, chân tay tê lạnh, suy giảm sinh dục, huyết áp cao, mệt mỏi.

Liều dùng – Cách dùng:

Trị các bệnh về thận dương suy:

- Người lớn: Uống 2 viên/lần, ngày 2 lần.
- Trẻ em từ 10-15 tuổi: Uống 1 viên/lần, ngày 2 lần.

Bồi bổ cơ thể trợ dương: Uống 1 viên/lần vào buổi sáng.

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 10 tuổi.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Thận trọng khi dùng thuốc cho người cao huyết áp.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Không có dữ liệu về tính tương tác, tương kỵ của thuốc. Không trộn lẫn thuốc này với thuốc khác.
- Cần tham vấn bác sĩ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc khác. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.
- Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

- Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói: Hộp 2, 3, 10 vỉ x 10 viên; lọ 30, 60, 100 viên.

Điều kiện bảo quản thuốc: Nơi khô, dưới 30°C.

Hạn dùng thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 1800.6689. Fax: (0272) 3.817.337

Điện Thoại: 1800.6689
(Trong giờ hành chính)