


MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ




112x88x48 mm

Tozam

Compositions : Each capsule contains :
Piracetam400mg
Cinnarizine25mg
Excipients q.s for1 capsule.
Indications, Contraindications, Dosage,
Administration: See the enclosed leaflet.
Storage: Keep in a cool and dry place,
protect from light, temperature below 30 °C
Specification: Manufacturer's.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY LEAFLET BEFORE USE



Producer :
TRƯỜNG THỌ PHARMACEUTICAL J.S.C
93 Linh Lang St., Ba Đình Dist, Hanoi
TEL: 04.37668912 - FAX: 04.37668914
No. 10/101, 1st floor, 1st floor, 1st floor, Hanoi Dist.



10 vial x 6 viên nang

Tozam

Thành phần : Mỗi viên nang có chứa:
Piracetam400mg
Cinnarizine25mg
Tá dược vừa đủ1 viên nang.
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng,
cách dùng :
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng.
Nhiệt độ dưới 30 °C
Tiêu chuẩn: TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

SỐ ĐĂNG KÝ :
Lô SX/Batch No. :
NSX/Mfg. Date :
HĐ/Exp. Date :
Nhà sản xuất :

CÔNG TY CPOT TRƯỜNG THỌ

93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 04.37668912 - FAX: 04.37668914
Nhà máy SX: Lô M1, Đường KS, KĐT Hòa Xá, Nam Đình

NHÃN VÍ

100 x 43 mm



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18 / 01 / 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ



**Tờ hướng dẫn sử dụng
Viên nang Tozam**

TÊN THUỐC: Tozam

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

Piracetam.....400 mg

Cinnarizine.....25 mg

Tá dược: Amidon, Talc, Aerosil vừa đủ cho 1 viên.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng

DƯỢC LỰC HỌC:

Tozam là sự kết hợp giữa 2 thành phần Piracetam và Cinnarizine, thuốc có tác dụng chống lại các ảnh hưởng của sự thiếu hụt oxy tới não. Đây là dạng phối hợp hiệp đồng nhằm chống lại các ảnh hưởng của sự thiếu hụt oxy và tăng cường tuần hoàn não. Thuốc làm tăng lưu lượng máu lên não. Dạng phối hợp không làm tăng tác dụng không mong muốn lên so với việc dùng từng thành phần đơn lẻ.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Thuốc được hấp thu nhanh chóng qua đường uống. Nồng độ đỉnh huyết tương của cinnarizine đạt được sau khoảng 2 – 4 giờ sau khi uống và tương ứng của piracetam là 1,5 giờ.

Piracetam có thể ngấm được vào tất cả các mô và qua được hàng rào máu - não, nhau – thai.

Cinnarizine được chuyển hóa hoàn toàn và được thải trừ qua nước tiểu (sau 72 giờ thuốc vẫn còn thải trừ qua nước tiểu). Trong khi piracetam thải trừ ở dạng không đổi qua nước tiểu (30 giờ sau khi uống, hơn 95% thuốc được thải trừ).

CHỈ ĐỊNH:

- Suy mạch máu mạn tính và tiềm tàng (ẩn náu) do vữa xơ động mạch và tăng huyết áp động mạch; trường hợp đột quỵ và sau đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở não bị loạn trương lực mạch máu;
- Nhược não sau chấn thương;
- Bệnh não do những nguyên nhân khác nhau;
- Hội chứng tâm thần – thực thể với rối loạn trí nhớ và các chức năng nhận thức khác hoặc các rối loạn thuộc lĩnh vực cảm xúc – ý muốn;
- Bệnh lý của mê đạo: chóng mặt, ù tai, buồn nôn, nôn, rung giật nhãn cầu;
- Hội chứng Ménière;
- Dự phòng đau yếu về vận động và đau nửa đầu;
- Cải thiện các quá trình nhận thức ở trẻ em chậm phát triển trí não.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn: ngày uống 3 lần, mỗi lần 1-2 viên ; thời gian điều trị từ 1-3 tháng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh.
- Trẻ em: ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1-2 viên.

Uống thuốc sau bữa ăn. Sản phẩm này không được sử dụng quá 3 tháng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc;
- Có suy giảm nghiêm trọng chức năng thận;
- Đột quỵ xuất huyết;
- Loạn chuyển hoá Porphyrin;

Ph

- Người mắc bệnh Huntington;
- Người mắc bệnh suy gan.

THẬN TRỌNG:

- Thuốc này phải sử dụng rất thận trọng ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan;
- Nếu suy thận nhẹ và vừa, cần giảm liều điều trị hoặc nói rộng khoảng cách giữa các liều, đặc biệt khi độ thanh thải của creatinin dưới 60 ml/phút. Cần theo dõi các giá trị enzym gan ở bệnh nhân suy chức năng gan;
- Tránh uống rượu trong thời kỳ dùng thuốc;
- Dùng thận trọng khi có tăng áp lực trong mắt và ở bệnh nhân bị Parkinson;
- Người bệnh có tiền sử đau dạ dày: Cũng như với những thuốc kháng histamin khác, Cinnarizine có thể gây đau vùng thượng vị. Uống thuốc sau bữa ăn có thể làm giảm kích ứng dạ dày;
- Thận trọng khi dùng thuốc ở người cao tuổi vì chức năng thận ở người cao tuổi giảm đồng thời khi dùng Cinnarizine dài ngày ở người cao tuổi thì có thể gây tăng hoặc xuất hiện những triệu chứng ngoại tháp, đôi khi kết hợp với cảm giác trầm cảm.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không dùng.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Thời kỳ mang thai: Không dùng.
- Thời kỳ cho con bú: chỉ dùng khi thật cần thiết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR):

- Tác dụng không mong muốn thường gặp: ngủ gà, bồn chồn, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi;
- Rất hiếm gặp các phản ứng quá mẫn cảm-phản ứng da, nhạy cảm ánh sáng;
- Trong một số trường hợp riêng biệt, có khi gặp rối loạn tiêu hóa: tăng tiết nước bọt, buồn nôn và nôn. Dùng kéo dài liên tục cho bệnh nhân cao tuổi có thể gây các tác dụng phụ ngoại tháp.

Chú ý: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Khi dùng đồng thời có thể làm tăng tác dụng ức chế thần kinh trung ương của các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương, thuốc trầm cảm 3 vòng, alcohol;
- Tăng tác dụng của các thuốc hạ áp và thuốc giãn mạch.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

- Thuốc rất dễ dung nạp và khi gặp quá liều, chưa gặp các tác dụng phụ nghiêm trọng mà cần ngừng thuốc;
- Nếu trẻ em mà dùng quá liều, thường gặp các triệu chứng kích thích như mất ngủ, hiếu động, sáng khoái, kích động, run và hiếm gặp ác mộng, ảo giác và co giật.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 6 viên/ vỉ.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin tham khảo ý kiến Bác sỹ

Nhà sản xuất :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

93 Linh Lang-Ba Đình-Hà Nội*Tel: 04.37666912 - Fax: 04.37666914

Nhà máy SX:Lô M1-Đường N3-KCN Hoà Xá-Nam Định*Tel: 0350.3670733

Website: <http://truongthopharma.com>

Ph