

TRÌNH BÀY: Hộp 10 gói x 3 g cốm

THÀNH PHẦN: Cho 1 gói 3 g

Cao đặc Hoa hòe (<i>Extractum Flos Styphniolabii japonici</i>)	209 mg
(Tương đương 830 mg Hoa hòe)	
Cao đặc Dừa cạn (<i>Extractum Follum Catharanthi rosei</i>).....	28 mg
(Tương đương 250 mg Dừa cạn)	
Cao đặc Cúc hoa (<i>Extractum Flos Chrysanthemi indici</i>).....	21 mg
(Tương đương 80 mg Cúc hoa)	
Cao đặc Cỏ ngọt (<i>Extractum Follum Steviae rebaudiana</i>).....	17 mg
(Tương đương 170 mg Cỏ ngọt)	
Cao đặc Tâm sen (<i>Extractum Embryo Nelumbinis nuciferae</i>).....	21 mg
(Tương đương 80 mg Tâm sen)	
Tá dược (<i>Lactose, Glucose, NaCMC</i>).....	vừa đủ

TÁC DỤNG:

- **Hoa hòe:** có tác dụng thanh nhiệt lương huyết, chỉ huyết. Thành phần Rutin trong Hoa hòe có tác dụng bảo vệ thành mạch, tăng sức bền của thành mạch. Hoa hòe thường được dùng cho bệnh nhân cao huyết áp mà mao mạch dễ bị vỡ, đứt, để đề phòng đứt mạch máu não, xuất huyết thận, xuất huyết phổi không rõ nguyên nhân.

- **Dừa cạn:** có chứa các alcaloid có tác dụng hạ huyết áp, lợi tiểu; giảm bạch cầu trong bệnh Hodgkin.

- **Cúc hoa:** có tác dụng phát tán phong thấp, thanh can, giải độc, sáng mắt, hạ huyết áp.

- **Tâm sen:** có tác dụng thanh tâm hỏa, dưỡng tâm, an thần.

***Thuốc hạ huyết áp Casoran có tác dụng:**

- Hạ huyết áp, an thần, lợi tiểu, thanh nhiệt.

- Tăng sức đàn hồi, bền vững thành mạch, giảm xung huyết, chống xơ vữa động mạch.

- Chống chóng mặt, nhức đầu, mất ngủ.

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc hạ huyết áp Casoran được dùng trong các trường hợp:

- Tăng huyết áp thể vừa và nhẹ.

- Tăng huyết áp dẫn đến đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê mỏi đầu chi.

- Phòng ngừa và phối hợp điều trị: tai biến mạch máu não.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Người lớn: mỗi lần 1 gói, ngày 3 lần.

Trẻ dưới 12 tuổi: mỗi lần 1 gói, ngày 2 lần.

Cách dùng: hoà tan mỗi gói vào cốc nước chín (40 ml).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Bệnh nhân bị huyết áp thấp.

- Phụ nữ có thai.

- Người trầm cảm.

- Người đang vận hành tàu xe, máy móc, làm việc trên cao.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa thấy có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn khi dùng thuốc.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

THẬN TRỌNG: Không có

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác với thuốc nào khác được ghi nhận.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai. Sử dụng được cho phụ nữ cho con bú.

TÁC ĐỘNG KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không dùng cho người đang vận hành tàu xe, máy móc, làm việc trên cao.

QUẢ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Hiện tại chưa có bất cứ báo cáo nào về những triệu chứng khi sử dụng thuốc quá liều.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
 NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ