




Từ liệu dành cho bác sĩ - Lưu hành nội bộ

# TVhepatic

**L-ornithin và L-aspartate 450 mg**

**HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC TRƯỜNG HỢP:**

- VIÊM GAN CẤP VÀ MẠN TÍNH, GAN NHIỄM MỠ, XƠ GAN.
- VIÊM GAN SIÊU VI, VIÊM GAN DO THUỐC, DO RƯỢU VÀ HÓA CHẤT
- TÌNH TRẠNG CHÁN ĂN, MỆT MỎI, SUY NHƯỢC CƠ THỂ ĐOTẾ BÀO GAN.
- GIẢI ĐỘC GAN DO RƯỢU.






Nhà phân phối:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT THẠNH VINH

SOX: VD-18293-13

KT: 145 x 205 (mm)

# TVhepatic



**Thành phần:** Mỗi viên nang mềm chứa:  
L - Ornithin L - Aspartat ..... 450mg;  
Tà được VD 1 Viên

**Tính chất:**

- **L-ornithine và L-aspartate** là một phức hợp muối kép, khác với thuốc chỉ có chứa L-ornithine thông thường. Sự phối hợp L-ornithine và L-aspartate có tác dụng tương hỗ trong quá trình làm giảm nồng độ amoniac (amoniac trong máu được sinh ra do phân hủy protid, gan có nhiệm vụ biến amoniac máu thành ure). Ngoài ra, Ornithine và Aspartate còn gián tiếp tham gia tạo ra năng lượng ATP để cung cấp năng lượng cho các quá trình tổng hợp urea và kích thích sự hoạt động các chức năng khác của gan. Đặc biệt chức năng chuyển hóa mỡ và tái tạo nhu mô gan. Đây là chức năng quan trọng trong điều trị gan nhiễm mỡ và điều trị viêm gan.
- Khi gan bị viêm do siêu vi hay do hóa chất như thuốc điều trị lao, do uống nhiều rượu, do điều trị bệnh ung thư, do ngộ độc thuốc trừ sâu thì nhu mô gan bị phá hủy, từ đó men gan tăng lên. Sau khi dùng Ornithine và Aspartate, kết quả cho thấy trên nhiều bệnh nhân đã được nghiên cứu thì triệu chứng bệnh gan cải thiện rất tốt, chỉ số men gan giảm nhanh, tình trạng xơ mỡ cũng cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân ăn ngon, hết rối loạn tiêu hóa, không chán ăn, da mặt hết vàng. Thường phụ nữ bị nám mặt do viêm gan hoặc do ngộ độc khí thải ghen, vì vậy dùng ornithine aspartate sẽ đem lại kết quả đáng kể.

**Cách dùng và liều dùng:**

- Uống mỗi lần 1-2 viên x 1-3 lần/ngày, tùy theo tuổi và triệu chứng bệnh.
- Dùng 3-4 tuần. Trong trường hợp bệnh nặng có thể dùng liều gấp đôi.

**Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Suy giảm chức năng thận.

**Thận trọng:**

- Khi có triệu chứng khó chịu xảy ra hoặc có tác dụng không mong muốn nên ngừng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc.
- Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Thuốc chỉ dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú khi thật cần thiết theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

*Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".*

**Hạn dùng:** 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

**Qui cách đóng gói:** Hộp 12 vỉ x5 viên nang mềm.

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Địa chỉ: La Khê - Hà Đông - TP Hà Nội	Phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT THẠNH VINH Địa chỉ: P.212 - Ngõ 20 - KĐT Pháp Vân - Tô Hiệu - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội
--	--