

VIÊN ĐẶT Vagidequa**Thành phần:**

Mỗi viên sáp có chứa: Hard fat, dequalinium clorid, silic dioxid

Dạng bào chế: viên đặt âm đạo

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 vỉ 6 viên.

Công dụng:

- Giảm tiết dịch, giảm viêm, ngứa, mùi hôi trong: nhiễm khuẩn âm đạo và nhiễm nấm âm đạo (như nấm *Candida*); nhiễm ký sinh trùng *Trichomonas*.
- Giúp dự phòng và hỗ trợ điều trị nhiễm khuẩn trước các phẫu thuật về phụ khoa và trước khi sinh.

Đối tượng

Phụ nữ

Có thể sử dụng cho phụ nữ cho con bú và phụ nữ có thai ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ. Cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai trong ba tháng đầu.

Liều lượng, cách dùng:

1 viên đặt âm đạo/ngày trong 6 ngày.

Nên ngừng khi đang có kinh nguyệt và sau đó tiếp tục dùng trở lại.

Nên điều trị liên tục ngay cả khi không còn các triệu chứng khó chịu nữa (ngứa, tiết dịch, mùi khó chịu). Điều trị dưới 6 ngày có thể dẫn đến tái phát.

Viên đặt nên được đưa vào âm đạo càng sâu càng tốt, và thời gian sử dụng tốt nhất là trước khi đi ngủ vào ban đêm để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Tốt nhất là thực hiện ở tư thế nằm với cẳng chân hơi gập lại. Rửa sạch tay trước khi bóc vỉ và sau khi sử dụng sản phẩm.

Cách sử dụng thanh đẩy:

Vệ sinh sạch sẽ tay trước khi sử dụng




Bóc viên đặt, để vào phần đầu của thanh đẩy



Giữ tư thế nằm với cẳng chân hơi gập lại
Đưa thanh đẩy vào âm đạo sâu khoảng 2-3 cm, ấn pittong nhẹ nhàng đẩy viên đặt vào âm đạo



Vệ sinh thanh đẩy bằng nước sôi sau khi sử dụng, để khô.
Bảo quản nơi khô ráo

**Chú ý:**

- Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.
- Trước khi dùng nên để trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 2-8°C. Kiểm tra viên đặt trước khi dùng phải đảm bảo đủ độ cứng, dễ dàng đưa viên đặt vào âm đạo. Bóc viên ra phải nhét ngay vào âm đạo vì rời lớp vỏ, viên dễ tan nhanh
- Nên sử dụng bằng vệ sinh để không rây thuốc ra quần áo

Lưu ý:

Không dùng sản phẩm khi:

- Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần nào của tá dược.
- Loét biểu mô âm đạo và cổ ngoài cổ tử cung.
- Chưa từng quan hệ tình dục

Một số phản ứng có thể có

Trong hiếm các trường hợp, có thể có ngứa, nóng rát hoặc đỏ. Tuy nhiên, những phản ứng phụ này cũng có thể liên quan với các triệu chứng của nhiễm khuẩn âm đạo. **Trong những trường hợp này không cần ngưng điều trị.** Nếu các khó chịu kéo dài, bệnh nhân nên đến chữa trị ở cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Phản ứng kích ứng tại chỗ như tổn thương bề mặt chảy máu ở âm đạo khoảng 0,002% **do bề mặt âm đạo (biểu mô âm đạo) đã bị tổn thương trước đó**, do thiếu hụt estrogen hoặc do tình trạng viêm rõ rệt. Trong những trường hợp này bệnh nhân phải ngừng điều trị và nên đến chữa trị ở cơ sở y tế.

Bảo quản: Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI.

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội