

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Hướng dẫn sử dụng thuốc
GMP-WHO

THUỐC NHỎ MẮT

Vidroline

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thành phần công thức thuốc: mỗi lọ 15 ml chứa:

- Thành phần dược chất: Tetrahydrozolin hydroclorid: 0,05%
- Thành phần tá dược: Benzalkonium clorid, dinatri edetat, acid boric, natri tetraborat, polyethylen glycol 400, natri clorid, borneol, nước cất.

Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt.

Mô tả sản phẩm: Dung dịch trong, không màu, mùi thơm đặc trưng.

Chỉ định:

- Điều trị tình trạng mắt đỏ, sung huyết kết mạc, ngứa mắt, sưng mắt, mỏi mắt. Làm giảm phù kết mạc, sung huyết thứ phát do dị ứng và các kích thích nhẹ ở mắt.
- Làm giảm đỏ mắt do bụi, khói, gió, ánh nắng chói, phấn hoa, nước (khi bơi lội)...; do đọc sách, sử dụng máy vi tính, xem tivi nhiều hay do dùng kính áp tròng.

Liều dùng, cách dùng:

- Nhỏ một đến hai giọt vào mỗi mắt, dùng 3 - 4 lần/ngày, hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ.
- Trẻ em dưới 6 tuổi: cần có ý kiến của bác sĩ.
- Dùng kỹ nắp sau mỗi lần sử dụng.

Chống chỉ định:

- Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
- Người tăng nhãn áp.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Trẻ em dưới 6 tuổi và những người có tiền sử dị ứng với thuốc nhỏ mắt cần tham vấn bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng.
- Những người đau mắt nặng hoặc đang trong quá trình điều trị cần tham vấn bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng.
- Nếu các triệu chứng kích thích hay đỏ mắt không suy giảm hoặc tăng thêm sau 3 ngày sử dụng thuốc, cần ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.
- Sử dụng tetrahydrozolin hydroclorid nhỏ mắt có thể gây giãn phóng sáng võ mạc mắt, đặc biệt là khi sử dụng liều cao cho bệnh nhân cao tuổi. Tetrahydrozolin hydroclorid được chống chỉ định ở những bệnh nhân tăng nhãn áp.
- Sử dụng tetrahydrozolin hydroclorid quá liều kéo dài có thể gây viêm kết mạc cấp tính và mạn tính.
- Thuốc có chứa benzalkonium clorid, vì vậy khi sử dụng để nhỏ mắt có thể gây kích ứng mắt trong các trường hợp mẫn cảm.
- Cần tránh để thuốc tiếp xúc với kính áp tròng mềm vì benzalkonium clorid được biết đến làm mất màu kính áp tròng mềm. Những người mang kính áp tròng, cần bỏ kính ra trước khi dùng và mang lại sau khi dùng thuốc ít nhất 15 phút.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Không dùng chung với các thuốc IMAO, thuốc chống trầm cảm ba vòng.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Phản ứng bất lợi thường không phổ biến. Tuy nhiên, không nên dùng thuốc quá liều vì có thể làm gia tăng chứng đỏ mắt.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

- Nếu dùng thuốc quá liều có thể gây sung huyết.
- Xử trí: Chủ yếu bằng điều trị triệu chứng.

Đặc tính dược lực học:

Nhóm dược lý: Chế phẩm sử dụng cho mắt.

Mã ATC: S01GA02.

- Tetrahydrozolin là một thuốc giống thần kinh giao cảm, có tác dụng co mạch tại chỗ nhanh và kéo dài.

- Cơ chế tác dụng: Thuốc kích thích trực tiếp lên thụ thể α -adrenergic của hệ thần kinh giao cảm và hầu như không có tác dụng trên thụ thể β -adrenergic. Khi nhỏ vào kết mạc mắt, tetrahydrozolin gây co tại chỗ các tiểu động mạch và làm giảm các triệu chứng phù kết mạc và sung huyết thứ phát đối với các trường hợp dị ứng và kích thích nhẹ ở mắt.

Đặc tính dược động học:

- Sau khi nhỏ thuốc lên kết mạc, tác dụng co mạch đạt sau vài phút và kéo dài từ 4 đến 8 giờ. Đôi khi thuốc có thể hấp thu và gây tác dụng toàn thân.
- Chưa có báo cáo về phân bố và thải trừ của thuốc.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15ml.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng sau khi mở nắp bao bì trực tiếp lần đầu: 30 ngày.

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: Tiêu chuẩn cơ sở.

GN
PHARMA

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN

Địa chỉ: Đường YP6, KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222.3699285 * Số fax: 0222.3699286

Website: www.gianguyenpharma.com

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Chu Quốc Thịnh