

Lần đầu: 24 / 9 / 2012

Hộp 1 vỉ x 10 viên nang cứng

Traphaco[®]

Hộp 1 vỉ x 10 viên nang cứng

Didiçero

SDK:
Số Lô SX:
NSX:
HD:

Bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh

Phồng phồng	0,2g
Tế tăn	0,2g
Quốc chi	0,2g
Độc hoạt	0,3g
Xuyên khung	0,2g
Đương qui	0,2g
Ngưu tất	0,2g
Bạch thược	0,2g
Đỗ trọng	0,2g
Tông ký sinh	0,2g
Cam thảo	0,2g
Sinh địa	0,2g
Bạch linh	0,2g
Tân giao	0,2g
Đẳng sâm	0,2g
Tà dược (Talc, Magnesi stearat, PVP, Aerosil)	vừa đủ
	1 viên

Trừ phong thấp, bổ khí huyết, bổ can thận.

- Viêm, đau thần kinh ngoại biên: thần kinh tọa
- Viêm khớp, đau nhức khớp xương.
- Đau mỗi lung

- Uống 2-3 viên/lần x 3 lần/ngày, uống sau bữa ăn.
- Đạt điều trị thông thường từ 1-2 tháng. Có thể tăng liều tùy theo tình trạng bệnh.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 36810724 / Fax: (84-4) 36811542
Tư vấn khách hàng: 18006612
Sân xuất tại:

C.TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

KT hộp: 110 x 67 x 20 (mm)



NỘI DUNG MẪU NHÃN HỘP THUỐC VIÊN NANG DIDICERA

(Hộp 2 vỉ x 10 viên nang)



KT hộp: 110 x 67 x 20 (mm)



NỘI DUNG MẪU NHÃN HỘP THUỐC VIÊN NANG DIDICERA (Hộp 5 vỉ x 10 viên nang)



Didicera®

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng



Traphaco®



CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem hóa hướng dẫn sử dụng.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XÁ TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN: Bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh

Phòng phong	0.2g	Đỗ trọng	0.2g
Tế tân	0.2g	Tang ký sinh	0.2g
Quế chi	0.2g	Cam thảo	0.2g
Độc hoạt	0.3g	Sinh địa	0.2g
Xuyên khung	0.2g	Bạch linh	0.2g
Đương qui	0.2g	Tân giao	0.2g
Ngưu tất	0.2g	Đẳng sâm	0.2g
Bạch thược	0.2g	Tá dược (Talc, Magnesi stearat, PVP, Aerosil)	vừa đủ
			1 viên

Didicera®

5 blisters x 10 capsules



Traphaco®



TÁC DỤNG:

Trừ phong thấp, bổ khí huyết, bổ can thận.

CHỈ ĐỊNH:

- Viêm, đau thần kinh ngoại biên; thần kinh tọa.
- Viêm khớp, đau nhức khớp xương.
- Đau mỏi lưng.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Uống 2-3 viên/lần x 3 lần/ ngày, uống sau bữa ăn.
- Đạt điều trị thông thường từ 1-2 tháng. Có thể tăng liều tùy theo tình trạng bệnh.

SDK:

Số lô SX:

NSX:

HD:







KT vỉ: 106 x 61 (mm)

Số lô SX, Hạn dùng dập nổi trên vỉ

KT hộp: 110 x 67 x 50 (mm)

NỘI DUNG MẪU NHÃN HỘP THUỐC VIÊN NANG DIDICERA (Hộp 10 vỉ x 10 viên nang)



KT vỉ: 106 x 61 (mm)

Số lô SX, Hạn dùng dập nổi trên vỉ

KT hộp: 110 x 50 x 67 (mm)

Toa hướng dẫn sử dụng



DIDICERA

DIDICERA có xuất xứ từ phương thuốc cổ truyền “Độc hoạt tang ký sinh”. Trong đó Độc hoạt, Tang ký sinh, Tế tân, Quế chi, Tần giao, Phòng phong có tác dụng trừ phong thấp, giảm đau. Đảng sâm, bạch linh, Cam thảo là thuốc bổ khí. Xuyên khung, Đương qui, Sinh địa, Bạch thược có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết. Đỗ trọng, Ngưu tất, Tần giao có tác dụng bổ can thận, mạnh gân cốt. Sự phối hợp các vị thuốc trong phương thuốc có tác dụng điều trị cả nguyên nhân sinh bệnh và các triệu chứng của bệnh. DIDICERA được dùng trong trường hợp phong thấp mạn tính và các đợt cấp của phong thấp mạn tính

Trình bày: Hộp 1, 2, 5, 10 vỉ x 10 viên nang

Thành phần: Bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh.


Thành phần	Hàm lượng
Phòng phong (<i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i>)	0,2g
Tế tân (<i>Herba Asari</i>)	0,2g
Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>)	0,2g
Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>)	0,3g
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	0,2g
Đương qui (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,2g
Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	0,2g
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	0,2g
Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>)	0,2g
Tang ký sinh (<i>Herba Loranthi</i>)	0,2g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,2g
Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae</i>)	0,2g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,2g
Tần giao (<i>Radix Gentianae</i>)	0,2g
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	0,2g
Tá dược (Talc, Magnesi stearat, PVP, Aerosil)	Vừa đủ 1 viên

Tác dụng: Trừ phong thấp, bổ khí huyết, bổ can thận.

Chỉ định:

- Viêm, đau thần kinh ngoại biên: thần kinh tọa.
- Viêm khớp, đau nhức khớp xương.
- Đau mỏi lưng

Traphaco



Hồ sơ đăng ký Viên nang Didicera

Liều dùng, cách dùng:

- Uống 2 -3 viên/lần x 3 lần/ ngày, uống sau bữa ăn.
- Đợt điều trị thông thường từ 1 – 2 tháng. Có thể tăng liều tùy theo tình trạng bệnh.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ có thai hoặc trong thời gian hành kinh

Thận trọng: Không có

Tác dụng không mong muốn: Chưa thấy có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn của thuốc gây nên.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên

