

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 27/02/2019

280/164

Mẫu nhẫn lọ 30 viên. KT(mm): 140 x 35



GMP - WHO



TIÊU CHUẨN: TCCS

BẢO QUẢN: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em.



TÁC DỤNG: Tú bổ can thận

CHÍ ĐỊNH: Trị can thận âm hư gây chướng, mệt, ù tai, vướng lưỡi, đau mỏi thái dương, đau đầu gối, hụ hoà bốc tép gây đau nhức trong xương, cốt chung triều nhiệt, long bàn tay, bàn chân nóng, mệt đờ, mồ hôi trộm, di tinh, tiêu khát.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Uống thuốc sau ăn. Người lớn: Mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 2 lần. Trẻ em: Mỗi ngày uống 1 viên. Xem hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Số DK:
Số Lo SX:
NSX:
HD:

Mẫu hộp, nhẫn lọ 30 viên. KT(mm): 72 x 53 x 53

CỘ HÀ NAM, ngày 10 tháng 1 năm 2018
CONG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT
DƯỢC PHẨM
HOA VIỆT
PHỦ LÝ - HÀ NAM

KIỂM TRA

Nguyễn Anh Đức

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
Lê Tiến S

Mẫu hộp 3 vi x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN:	Mỗi viên nang cứng chứa Cao đặc hỗn hợp 550mg. Tương đương 4,4g được tiêu hóa.
Thực địa.....	1.408g
Hoai sơn.....	0.704g
Sơn thù.....	0.704g
Mẫu đơn bì	0.528g
Phục linh.....	0.528g

Trach tá..... 0,528g
 Tá được vita dài..... 1 viên
 Tiêu chuẩn: TCCS
BẢO QUẢN: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em.

CÔNG TY CỔ PHẦN Dược Phẩm HOA VIỆT
Số 1234 Trường Chinh - P. Mê Linh - TP. Thủ Đức - Hồ Chí Minh - ĐT: 02263.885.745
SK: Lai La CP - KCN Chơn Thành - P. Chơn Thành - TP. Thủ Đức - Hồ Chí Minh - ĐT: 02263.855.331
Website: www.vietpharm.com



HD:	CHI DỊNH: <i>Tin cậy</i> là tin tức xác định một, nỗi, và/or điều mà một khía cạnh, và/hoặc một khía cạnh khác của một khía cạnh xác định.	CHI DỊNH: <i>Tin cậy</i> là tin tức xác định một, nỗi, và/or điều mà một khía cạnh, và/hoặc một khía cạnh khác của một khía cạnh xác định.	CHI DỊNH: <i>Tin cậy</i> là tin tức xác định một, nỗi, và/or điều mà một khía cạnh, và/hoặc một khía cạnh khác của một khía cạnh xác định.	NSX:
95,6% SX:	bay bán chia nhánh, mua, mua hổn tên, đổi tên, thay tên, thay biển.	bay bán chia nhánh, mua, mua hổn tên, đổi tên, thay tên, thay biển.	bay bán chia nhánh, mua, mua hổn tên, đổi tên, thay tên, thay biển.	95,6% SX:
95,6% DK:	using 2 bits per term. Most likely using 3 words.	using 2 bits per term. Most likely using 3 words.	using 2 bits per term. Most likely using 3 words.	95,6% DK:
HD:	CHONG CHI DINH VA CALC THONG TIN KHOA: Xem huong dan su dung tinh truc kham theo.	CHONG CHI DINH VA CALC THONG TIN KHOA: Xem huong dan su dung tinh truc kham theo.	CHONG CHI DINH VA CALC THONG TIN KHOA: Xem huong dan su dung tinh truc kham theo.	HD:



KIỂM TRA


Ng Anh Đức

Hà Nam, ngày 10 tháng 1 năm 2028



GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
Lê Văn Tý

Mẫu hộp 6 vi x 10 viên nang cứng. KT: 110 x 50 x 70



KIỂM TRA

Ngô Anh Đức

<https://trungtamthuoc.com/>



Mẫu màng nhôm ép vỉ, KT (mm): 92 x 63

Hà Nam, ngày 10 tháng 1 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT
PHÊ DUYỆT**

Kiểm tra

Đ
Nguyễn Anh Đức



P

Mẫu nhãn lọ 60 viên. KT(mm): 140 x 50



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa: Cao đặc hỗn hợp 550mg. Tương đương 4,4g được liệu gồm:
Thục địa 1,408g; Hoài son 0,704g; Sơn thù 0,704g;
Mẫu đơn bì 0,528g; Phục linh 0,528g; Trạch tả 0,528g; Tá dược vừa đủ 1 viên.
Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em.


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT
56/124 Trường Chinh - P. Minh Khai - TP. Phủ Lý - Hà Nam
ĐT: 02263.885.145
SX tại: Lô C9 - KCN Chùa Son - P. Chùa Son - TP. Phủ Lý - Hà Nam
ĐT: 02263.855.333
Website: www.yahoachauvet.com



TÁC DỤNG: Tú bổ can thận
CHỈ ĐỊNH: Trị can thận âm hư gây chóng mặt, ứ tai, vàng dầu, đau móm thất tùng, đau đầu gối, hư hỏa bốc lên gây đau nhức trong xương, cổ chung triều nhiệt, lòng bàn tay, bàn chân nóng, mặt đỏ, mồ hôi trên, đิ tinh, tiêu khát.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Uống thuốc sau ăn.
- Người lớn: Mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 2 lần.
- Trẻ em: Mỗi ngày uống 1 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Số DK:
Số Lô SX:
NSX:
HD:



THÀNH PHẦN
Mỗi viên nang cứng chứa: Cao đặc hỗn hợp 550mg. Tương đương 4,4g được liệu gồm:
Thục địa.....1,408g
Hoài son.....0,704g
Sơn thù.....0,704g
Mẫu đơn bì.....0,528g
Phục linh.....0,528g
Trạch tả.....0,528g
Tá dược vừa đủ.....1 viên
Tiêu chuẩn: TCCS
BẢO QUẢN
Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT
56/124 Trường Chinh - P. Minh Khai - TP. Phủ Lý - Hà Nam
ĐT: 02263.885.145
SX tại: Lô C9 - KCN Chùa Son - P. Chùa Son - TP. Phủ Lý - Hà Nam
ĐT: 02263.855.333
Website: www.yahoachauvet.com



TÁC DỤNG
Tú bổ can thận
CHỈ ĐỊNH
Trị can thận âm hư gây chóng mặt, ứ tai, vàng dầu, đau móm thất tùng, đau đầu gối, hư hỏa bốc lên gây đau nhức trong xương, cổ chung triều nhiệt, lòng bàn tay, bàn chân nóng, mặt đỏ, mồ hôi trên, đิ tinh, tiêu khát.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG
Uống thuốc sau ăn.
- Người lớn: Mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 2 lần.
- Trẻ em: Mỗi ngày uống 1 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC
Xem hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Số DK:
Số Lô SX:
NSX:
HD:

Mẫu hộp, nhãn lọ 60 viên. KT (mm): 82 x 53 x 53

KIỂM TRA

Ng Anh Đức

Hà Nam, ngày 16 tháng 1 năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT



Số Tel: 098

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

Viên nang cứng LỤC VỊ

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc



Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao đặc hỗn hợp	550 mg
Tương đương 4,400 g dược liệu gồm:	
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	1,408g
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	0,704g
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	0,704g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	0,528g
Phục linh (<i>Poria</i>)	0,528g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	0,528g
Tá dược: <i>Magnesi carbonat, Magnesi stearat, Talc, Methyl parahydroxybenzoat (Nipagin), Propyl parahydroxybenzoat (Nipasol).</i>	Vừa đủ 1 viên

Mô tả sản phẩm:

Viên nang cứng số 0, nắp và thân nang màu xanh, chứa bột thuốc màu nâu, mùi thơm dược liệu, vị hơi chua.

Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 lọ x 30 viên nang cứng kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 1 lọ x 60 viên nang cứng kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nang cứng kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 2 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nang cứng kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

Thuốc có tác dụng như thế nào?

Tư bổ can thận.

Thuốc dùng cho bệnh gì?

Trị can thận âm hư gây chóng mặt, ù tai, váng đầu, đau mỏi thắt lưng, đau đầu gối, hư hỏa bốc lên gây đau nhức trong xương, cốt chung triều nhiệt, lòng bàn tay, bàn chân nóng, mặt đỏ, mồ hôi trộm, di tinh, tiêu khát.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Uống thuốc sau ăn.

- Người lớn: Mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 2 lần.
- Trẻ em: Mỗi ngày uống 1 viên.

Khi nào không nên dùng thuốc này?

Người dương hư thể hư hàn, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

Nên tránh dùng những loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Chưa có báo cáo.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Nếu quên không dùng thuốc một lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều lượng chỉ dẫn. Không được gấp đôi liều dùng sau khi quên thuốc một lần.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?

Tiêu chảy là triệu chứng dễ gặp khi quá liều, thông báo cho bác sĩ để xử lý. Không dùng quá liều chỉ định.

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?

Tham vấn nhân viên y tế khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo.

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này?

Người bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa kém hấp thu. Trẻ em dưới 2 tuổi cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (*vận hành máy móc, lái tàu xe, làm việc trên cao...*): Không ảnh hưởng.

Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ?

Cần tham vấn bác sĩ khi đang dùng thuốc khác, hoặc khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tên, biểu tượng của cơ sở sản xuất:

Công ty đăng ký thuốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT

Địa chỉ: Số 124, đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

ĐT: 02263.885.145

Sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT

Địa chỉ: Lô C9, khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý,

tỉnh Hà Nam.* ĐT: 02263.855.333

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: Ngày
tháng năm



GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
Lê Tiến Sỹ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

Viên nang cứng LỤC VỊ

Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao đặc hỗn hợp

Tương đương 4,400 g dược liệu gồm:

Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	1,408g
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	0,704g
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	0,704g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	0,528g
Phục linh (<i>Poria</i>)	0,528g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	0,528g
Tá dược: <i>Magnesi carbonat, Magnesi stearat, Talc, Methyl parahydroxybenzoat (Nipagin), Propyl parahydroxybenzoat (Nipasol).</i>	Vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 lọ x 30 viên nang cứng kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 1 lọ x 60 viên nang cứng kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nang cứng kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 2 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nang cứng kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

Công năng:

Tư bổ can thận.

Chủ trị:

Trị can thận âm hư gây chóng mặt, ù tai, váng đầu, đau mỏi thắt lưng, đau đầu gối; hư hỏa bốc lên gây đau nhức trong xương, cốt chung triều nhiệt, lòng bàn tay, bàn chân nóng, mặt đỏ, mồ hôi trộm, di tinh, tiêu khát.

Cách dùng, liều dùng:

Uống thuốc sau ăn.

- Người lớn: Mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 2 lần.
- Trẻ em: Mỗi ngày uống 1 viên.

Chống chỉ định:

Người dương hư thể hư hàn, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng khi dùng thuốc:

Người bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa kém hấp thu. Trẻ em dưới 2 tuổi cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (*vận hành máy móc, lái tàu xe, làm việc trên cao...*): Không ảnh hưởng.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

Chưa có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo.

Quá liều và cách xử trí:

Tiêu chảy là triệu chứng dễ gặp khi quá liều. Không dùng quá liều chỉ định.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

Công ty đăng ký thuốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT

Địa chỉ: Số 124, đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

ĐT: 02263.885.145

Sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT

Địa chỉ: Lô C9, khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.* ĐT: 02263.855.333

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: Ngày tháng năm



GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Lê Tiến Sỹ



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh