



Hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

VIÊN NGẬM BỎ PHÉ CHỈ KHẢI LỘ

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
THỐNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI
KHI SỬ DỤNG THUỐC

❖ Thành phần công thức thuốc:

Thành phần được chất:	
Cao đặc hỗn hợp tương đương (Bạch linh (<i>Poria</i>) 36,0mg, Cát cánh (<i>Radix Platycodi Grandiflori</i>) 68,5mg, Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>) 130,0mg, Tang bạch bì (<i>Cortex Mori Albae Radicis</i>) 75,0mg, Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>) 26,5mg, Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis Japonici</i>) 50,0mg, Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>) 65,0mg, Bán hạ chế (<i>Rhizoma Pinelliae</i>) 60,0mg, Bách bộ (<i>Radix Stemonae Tuberosae</i>) 70,0mg, Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae Praeparatus</i>) 60,0 mg, Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>) 25,0mg, Bạch phán (<i>Alumen</i>) 8,0mg)	100 mg
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae arvensis</i>)	2,5 mg
Thành phần tá dược: (<i>Acid benzoic, Đường trắng, Talc, Magnesi stearat</i>) v.v	1 viên

- ❖ **Dạng bào chế:** Viên nén ngậm, viên nén hình trụ dẹt, màu nâu đen, mặt viên có khắc dấu hình thoi, mùi thơm dược liệu và tinh dầu bạc hà.
- ❖ **Chỉ định:** Tiêu đờm, giảm ho. Chữa các chứng ho, ho do cảm, ho gió, ho khan, ho lâu ngày, viêm phế quản.
- ❖ **Cách dùng – Liều dùng:**
 - Ngậm hoặc nhai trước khi nuốt, mỗi lần 1 viên.
 - Trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên: 3 – 6 viên/ngày.
 - Người lớn: 12 – 14 viên/ngày.
- ❖ **Chống chỉ định:** Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao, người tiểu đường.
- ❖ **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Chưa có báo cáo.
- ❖ **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**
 - Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.
 - Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú.
- ❖ **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Không ảnh hưởng.
- ❖ **Tương tác, tương kỵ của thuốc:** Chưa có báo cáo.





Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có báo cáo.

❖ **Quá liều và cách xử trí:**

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

❖ **Quy cách đóng gói:**

- Đóng 12 viên/vi x 2 vỉ/túi metallized + HDSD/hộp.
- Đóng 12 viên/vi x 5 vỉ/túi metallized + HDSD/hộp.

❖ **Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:**

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

❖ **Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143



QUẢN LÝ DƯỢC
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng

