

## VIÊN SANG MẮT

**TRÌNH BÀY:** Hộp 10 túi, 20 túi x 5 gam viên hoàn cứng.

**THÀNH PHẦN:** cho 1 túi 5 gam hoàn cứng:

Thục địa ( <i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i> )	800 mg
Hoài sơn ( <i>Tuber Dioscoreae persimilis</i> )	800 mg
Trạch tả ( <i>Rhizoma Alismatis</i> )	800 mg
Cúc hoa ( <i>Flos Chrysanthemi indicii</i> )	800 mg
Hà thủ ô đỏ ( <i>Radix Fallopieae multiflorae</i> )	800 mg
Thảo quyết minh ( <i>Semen Sennae torae</i> )	800 mg
Đương qui ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> )	800 mg
Hạ khô thảo ( <i>Spica prunellae</i> )	500 mg
Tá dược ( <i>Acid benzoic, đường trắng, Parafin, than hoạt, Bột talc, riboflavin</i> )	vd 5,0 g

### CHỈ ĐỊNH:

Các bệnh về mắt do can thận âm hư, huyết hư như:

- Mờ mắt, nhức mắt, khô mắt, chói mắt khi ra nắng.
- Thị lực giảm.
- Đau đầu chóng mặt, nóng đỉnh đầu, ban chẩn, dị ứng, mẩn ngứa (đặc biệt vùng đầu mặt, trứng cá).

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Người đái tháo đường.

**THẬN TRỌNG:** Khi dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

### LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:

*Người lớn:* Ngày uống 2- 3 lần, mỗi lần 1 túi (5 gam), uống với nước đun sôi để nguội.

*Trẻ em:* Dùng 1/2 liều người lớn.

### TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC:

Chưa phát hiện thấy tương tác của thuốc với các thuốc khác.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu có bất thường khi dùng thuốc cần ngừng ngay và báo cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết để xử lý.

**BẢO QUẢN:** Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC**

**Traphaco®**

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Tel: 024. 36810724 - 0221. 3791016 - Fax: 0221. 3991790

Điện thoại liên hệ: 18006612