

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VIÊN NÉN SỦI BỘT

MONGOR

TIÊU CHUẨN: TCCS

CÔNG THỨC:

Glucosamin sulfat 1000,00 mg
(Tương đương với 697,16 mg Glucosamin Base)
Tá dược: vừa đủ 1 viên nén sủi bọt (Kollidon 30, Natri bicarbonat, Acid citric khan, Aspartam, Mùi chanh (hoặc cam), Lutrol E6000 (PEG 6000), Simethicone).

CHỈ ĐỊNH:

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Dùng cho người trên 18 tuổi: uống từ 1250 mg đến 1500 mg Glucosamin/ngày (các dạng muối của glucosamin được quy đổi tương ứng với glucosamin), chia 3 lần. Có thể dùng đơn độc glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200 mg/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 - 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

THẬN TRỌNG:

-Không dùng quá liều chỉ định.
-Đây là thuốc trị nguyên nhân nên chỉ có tác dụng 5 -7 ngày sau khi uống, nếu đau nhiều cần uống thuốc giảm đau chống viêm những ngày đầu.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

-Về lý thuyết, glucosamin có thể làm giảm tác dụng của insulin hay các thuốc kiểm soát nồng độ đường trong máu khác.

-Dùng chung glucosamin với các thuốc lợi tiểu như furosemid có thể làm tăng tác dụng phụ của glucosamin.

-Glucosamin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng chung với các thuốc gây tăng nguy cơ chảy máu như acid acetylsalicylic, thuốc chống đông như warfarin hay heparin, thuốc chống kết tập tiểu cầu như clopidogrel và các thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen hay naproxen.

TÁC DỤNG PHỤ:

Hiếm thấy, nếu có thì thấy:

-Rối loạn tiêu hóa (nóng rát dạ dày, tiêu chảy).

-Ngứa, nổi mề đay.

-Chứng tán huyết ở người thiếu men G6PD.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Glucosamin không được khuyến dùng trong thai kỳ hoặc khi đang cho con bú

VẬN HÀNH TÀU XE:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy.

QUÁ LIỀU:

Chưa có báo cáo quá liều

Thông báo ngay cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc quá liều.

ĐÓNG GỘI: Tuýp 20 viên nén sủi bọt, hộp 1 tuýp.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

**NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN,
XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ
KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ HẠN SỬ DỤNG.**

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

www.spm.com.vn

Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo,

P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam.

ĐT: (028) 37507496 - Fax: (028) 38771010