

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
 Lần đầu: *12/1/12*

**VINOPA INJ**

**VINOPA INJ**

Drotaverin hydroclorid 40mg/2ml  
 Tb, Tm, Tdd

Hộp 10 ống x 2ml

Công thức: Cho 1 ống tiêm 2ml:  
 Drotaverin hydroclorid ..... 40mg  
 Tá dược, nước cất pha thêm vđ ..... 2ml

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng  
 Thận trọng, tác dụng không mong muốn:  
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng

Tên chuẩn: TCCS  
 SGK:  
 Bảo quản:  
 Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

**ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG**

VINOPA  
 Drotaverin hydroclorid  
 40mg/2ml  
 Tb, Tm, Tdd

Nhân trên ống VINOPA  
 Kích thước (3,6 x 2,2)cm

8935110 200656

Số lô SX:  
 NSX:  
 HD:

GMP - WHO, ISO 9001:2008  
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH PHÚC  
 Nhà máy Phường Khe Quang, TP Vinh, Tđd  
 Số 77 Đường Lê Lợi, Khe Quang, TP Vinh, Tđd  
 Mã 0211 3663 726 - Fax 0211 3663 776

**VINOPA**

Drotaverin hydroclorid 40mg/2ml

Tb, Tm, Tdd

Hộp 10 ống x 2ml

Nhân trên hộp VINOPA 5 ống x 3 x 7)cm  
 Kích thước(9,5 x 3 x 7)cm



Mẫu tờ hướng dẫn sử dụng thuốc tiêm VINOPA

**DUNG DỊCH TIÊM**

**VINOPA 40mg/2ml**

**Công thức:** Công thức cho 1 ống thuốc tiêm 2 ml:

Drotaverin hydroclorid.....40,0 mg

Tà dươc (Natri metabisulfit, còn 96%, nước cất pha tiêm) vđ 2 ml

**Dạng thuốc:** Dung dịch tiêm.

**Quy cách đóng gói:** Hộp 10 ống x 2 ml.

Hộp 6 ống x 2ml

Hộp 5 ống x 2ml

Hộp 12 ống x 2ml

**Dược lực học:**

Drotaverin là thuốc chống co thắt hướng cơ tác dụng trực tiếp lên cơ trơn. Tác động này không liên quan đến hệ thần kinh tự chủ (không thuộc nhóm kháng choline). Drotaverin làm giảm co thắt cơ trơn đặc biệt ở nơi có co thắt.

**Dược động học:**

Sau khi tiêm 2-4 phút thuốc bắt đầu có tác dụng, tác dụng tối đa sau 30 phút. Chuyển hóa tại gan bằng hiện tượng glucurono kết hợp. Gắn kết rất ít với protein huyết tương. Thời gian bán hủy là 18 – 22 giờ.

**Chỉ định:**

- Co thắt dạ dày ruột, hội chứng ruột bị kích thích
- Con đau quận mật và các co thắt đường mật: sỏi ống và túi mật, viêm túi mật, viêm đường mật.
- Con đau quận thận và co thắt niệu: sỏi thận, sỏi niệu quản, viêm bể thận, viêm bàng quang

**Cách dùng, liều dùng:**

- Người lớn: 1-2 ống/ngày, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp. Ngày 1-3 lần
- Trong trường hợp đau quận cấp tính do sỏi: tiêm tĩnh mạch chậm 1-2 ống

**Chống chỉ định:** Quá mẫn với các thành phần của thuốc. Suy nặng chức năng tim, thận, gan, bloc nhĩ thất độ II – III.

**Tương tác thuốc:** Vinopa làm giảm tác dụng chống parkinson của Levodopa

**Tác dụng không mong muốn:**

Hiếm gặp, có thể thấy buồn nôn, chóng mặt. Huyết áp tụt nếu tiêm tĩnh mạch nhanh.

*“Thông báo cho Thầy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”*

**Thận trọng:**

**Phụ nữ có thai và cho con bú:** Nghiên cứu trên động vật cho thấy chưa có bất kỳ hiện tượng sinh quái thai nào. Tuy nhiên, nên tránh sử dụng vinopa trong thời kỳ mang thai và cho con bú trừ khi thật cần thiết

**Khi lái xe và vận hành máy móc:** không nên sử dụng thuốc khi lái xe, vận hành máy móc

**Quá liều và cách xử trí:**

Chưa có báo cáo.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30<sup>0</sup>C, tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn:** TCCS.



*“Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ”*

**ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM**

*“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

*Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Thầy thuốc”*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO**

Địa chỉ: Số 777 Mê Linh – TP. Vĩnh yên - Vĩnh phúc

Nhà máy sản xuất: Thôn Mậu Thông-P.Khai Quang-T.Vĩnh Phúc

ĐT: 02113 862705 Fax: 02113 862774

Nhà máy: Thôn Mậu Thông - P. Khai Quang – TP.Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc