

## MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc : **VITAMIN C 250 mg**

Dạng thuốc: **VIÊN NANG**

Hàm lượng cho 1 viên:  
**Vitamin C                      250 mg**

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P.An Hòa – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P.An Hòa – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Tên thuốc :  
Lần đầu: 20/12/2012

Dạng thuốc:

## MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

**VITAMIN C 250 mg**

**VIÊN NANG**

Hàm lượng cho 1 viên: **Vitamin C**

**250 mg**

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ.

\* Nhãn trên chai 100 viên nang:

THÀNH PHẦN: Vitamin C ..... 250 mg  
Tá dược vừa đủ ..... 1 viên

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các bệnh do thiếu vitamin C với các triệu chứng: không lành vết thương, chảy máu dưới da, chảy máu lợi,...

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:**  
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.  
**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

Sản xuất bởi: DHG PHARMA  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
ĐT: (0710) 3891433 • Fax: (0710) 3895209

GMP - WHO

**VITAMIN C**  
250 mg

DHG PHARMA

Chai 100 viên nang

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:  
Người lớn: uống 1 - 2 viên x 1 - 2 lần ngày.  
Trẻ em: uống 1 viên x 1 - 2 lần ngày.  
Hoặc theo chỉ dẫn của nhà thuốc.

Tư Vấn Khách Hàng  
0710.3895209  
www.dhgpharma.com.vn

8 935206 400611 7 SDN:

Ngày SX:  
Số lô SX:  
HD :





\* **Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:**



# VITAMIN C

250 mg

**CÔNG THỨC:**

Vitamin C ..... 250 mg  
Tá dược vừa đủ ..... 1 viên  
(Tinh bột sắn, talc, sodium starch glycolat, aerosil).

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Chai 100 viên.

**TÍNH CHẤT:** Vitamin C cần cho sự tạo thành collagen, tu sửa mô trong cơ thể và tham gia trong một số phản ứng oxy hóa - khử. Vitamin C tham gia trong chuyển hóa phenylalanin, tyrosin, acid folic, norepinephrin, histamin, sắt, và một số hệ thống enzym chuyển hóa thuốc, trong sử dụng carbohydrat, trong tổng hợp lipid và protein, trong chức năng miễn dịch, trong đề kháng với nhiễm khuẩn, trong giữ gìn sự toàn vẹn của mạch máu và trong hô hấp tế bào. Thiếu hụt vitamin C dẫn đến bệnh scorbut, trong đó có sự sai sót tổng hợp collagen với biểu hiện là không lành vết thương, khiếm khuyết về cấu tạo răng, vòm miệng gây nhiều đốm xuất huyết, đấm bầm máu, chảy máu dưới da và niêm mạc (thường là chảy máu lợi).

Vitamin C được hấp thu dễ dàng sau khi uống. Vitamin C phân bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương kết hợp với protein. Vitamin C được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu.

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các bệnh do thiếu vitamin C với các triệu chứng: không lành vết thương, chảy máu dưới da, chảy máu lợi,...

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase (G6PD), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

**THẬN TRỌNG:** Không dùng vitamin C liều cao kéo dài.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Vitamin C đi qua nhau thai. Nếu dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường hàng ngày thì chưa thấy xảy ra vấn đề gì trên người. Tuy nhiên, uống những lượng lớn vitamin C trong khi mang thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.

Vitamin C phân bố trong sữa mẹ. Người cho con bú dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường, chưa thấy có vấn đề gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Sự acid hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác. Vitamin C là một chất khử mạnh nên ảnh hưởng nhiều đến xét nghiệm dựa trên phản ứng oxy hóa khử.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Tăng oxalat - niệu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mất ngủ, và tình trạng buồn ngủ đã xảy ra. Sau khi uống liều 1g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thể xảy ra tiêu chảy.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUẢ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:** Những triệu chứng quá liều gồm có: buồn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy và tiểu chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Người lớn: uống 1 - 2 viên x 1 - 2 lần/ ngày.

Trẻ em: uống 1 viên x 1 - 2 lần/ ngày.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.



**PHÓ CỤC TRƯỞNG**  
*Nguyễn Văn Thanh*

Sản xuất bởi: DHG PHARMA  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng  
☎ 0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn  
www.dhgpharma.com.vn

