

MẪU NHÃN

1. Nhãn lọ 90 viên

Thành phần : Cho 1 viên nén bao phim

- Cao khô hỗn hợp.....	350 mg
Tương ứng với:	
+ <i>Thuong nhit tu</i>	334 mg
+ <i>Bac ha</i>	83 mg
+ <i>Bach chi</i>	125 mg
+ <i>Tân di hoa</i>	250 mg
+ <i>Phong phong</i>	250 mg
+ <i>Bach truat</i>	250 mg
+ <i>Hoang ky</i>	417 mg
- <i>Bach chi</i>	125 mg
- <i>Tá dược vừa đủ</i>	1 viên

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ
DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Danapha
PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Vixolis

CHỮ THIỆT
KHANG MỆCH MÃN TÍNH
VIÊM MÀ KHANG

Lọ 90 viên nén bao phim

Chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xin xem kỹ trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Liều lượng và cách dùng:
- Người lớn: ngày uống 3 lần/ mỗi lần 3 viên.
- Trẻ em: ngày uống 3 lần/ mỗi lần 2 viên.

Bảo quản: Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

253 Đường Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng - Việt Nam

STY. CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

SX. Tại KCN. Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

2. Nhãn hộp 1 lọ x 90 viên

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 9 / 9 / 15

Bản 1

Vixolis

Compositions: Each film-coated tablet contains:
- Dry combined extract..... 350 mg
Equivalent to:
+ *Fructus Xanthii*..... 334 mg
+ *Herba Menthae*..... 83 mg
+ *Radix Angelicae dahuricae*..... 125 mg
+ *Flos Magnoliae*..... 250 mg
+ *Radix Ligustici brachylobi*..... 250 mg
+ *Rhizome Atractylodis macrocephalae*..... 250 mg
+ *Radix Astragal*..... 417 mg
- *Radix Angelicae dahuricae*..... 125 mg
- Excipients q.s.f.

Dosage, indications, contraindications & other information:
Please read carefully the leaflet inside the box.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE PACKAGE
INSERT BEFORE USE

Danapha
PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Vixolis

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim

- Cao khô hỗn hợp.....	350 mg
Tương ứng với:	
+ <i>Thuong nhit tu</i>	334 mg
+ <i>Bac ha</i>	83 mg
+ <i>Bach chi</i>	125 mg
+ <i>Tân di hoa</i>	250 mg
+ <i>Phong phong</i>	250 mg
+ <i>Bach truat</i>	250 mg
+ <i>Hoang ky</i>	417 mg
- <i>Bach chi</i>	125 mg
- <i>Tá dược vừa đủ</i>	1 viên

Chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xin xem kỹ trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Liều lượng và cách dùng:
- Người lớn: ngày uống 3 lần/ mỗi lần 3 viên.
- Trẻ em: ngày uống 3 lần/ mỗi lần 2 viên.

Bảo quản: Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

253 Đường Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Danapha
PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Vixolis

Treatment of
CHRONIC SINUSITIS

1 bottle
x 90 film coated tablets.

Sản xuất tại KCN. Hòa Khánh,
Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

8 934901 1310383

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 5 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

DANAPHA

Đ. THANH KHÊ TP. Đ. M. N. Đ.

DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

VIXOLIS

THÀNH PHẦN: Cho mỗi viên nén bao phim

Cao khô hỗn hợp..... 350 mg

Tương ứng với:

+ Thương nhĩ tử (*Fructus Xanthii*)334 mg

+ Bạc hà (*Herba Menthae*).....83 mg

+ Bạch chỉ (*Radix Angelicae dahuricae*)125mg

+ Tân di hoa (*Flos Magnoliae*)250 mg

+ Phòng phong (*Radix Ligustici brachylobi*)250 mg

+ Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*)250 mg

+ Hoàng kỳ (*Radix Astragali*).....417 mg

Bạch chỉ (*Radix Angelicae dahuricae*)..... 125 mg

Tá dược (Lactose monohydrat, Calci hydrophosphat, Povidon K30, Avicel 102, Sodium starch glycolat, Aerosil, Magnesi stearat, Maltodextrin, HPMC 606, HPMC 615, Talc, Titan dioxid, Polyethylen glycol 400, Màu oxyd sắt vàng) vừa đủ..... 1 viên

ĐƯỢC LỰC HỌC

-Theo y học Đông phương nguyên nhân của viêm xoang là do cơ địa dị ứng nhiễm khuẩn, dị ứng do lạnh (khí, phế hư) khi gặp phải các tác nhân phong hàn, phong nhiệt, nhiệt độc... mà gây ra. VIXOLIS có tác dụng thanh phế nhiệt, dưỡng âm, nhuận táo, đồng thời có tính giải độc, tiêu độc. Vì vậy nó làm giảm các triệu chứng của viêm mũi, viêm xoang rất công hiệu.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC: Không có thông tin.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị viêm xoang mũi mãn tính,viêm đa xoang.
- Sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, hắt hơi, dị ứng do thay đổi thời tiết, khói bụi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với bất kì thành phần nào của thuốc.
- Trẻ em dưới 5 tuổi

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG

- Người lớn: ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 viên.
- Trẻ em: ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.
- Thời gian điều trị: Để phát huy công hiệu của thuốc, cần phải dùng thuốc đủ thời gian (kể cả khi đã hết triệu chứng của bệnh):
 - + Đối với bệnh nhẹ: Thời gian dùng không dưới 30 ngày.
 - + Đối với bệnh nặng: Thời gian dùng không dưới 60 ngày.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

Chưa có thông tin về tác dụng ngoại ý.

*** Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.**

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Cần sử dụng thận trọng ở phụ nữ có thai và cho con bú.

NGƯỜI ĐANG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa ghi nhận được ảnh hưởng nào trên người lái xe hay vận hành máy móc.



TƯƠNG TÁC THUỐC

- Chưa có thông tin

QUÁ LIỀU

- Chưa có thông tin

KHUYẾN CÁO

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng.

- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN

- Hộp 1 lọ x 90 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

- Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY TRẺ EM.

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Tel : 0511.3760130

Fax : 0511.3760127

Email : info@danapha.com

Và được phân phối tại các chi nhánh trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày...5...tháng...5...năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Trị, MBA



**TU QUẢN TRỊ
P. TRƯỞNG PHÒNG**
Nguyễn Thị Thu Thủy

