



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Viên đặt VNP LADA supp



Giữ nhiệt:
Viên đặt có chứa tác nhân chống viêm, tác nhân chống dị ứng, tác nhân làm dịu vết thương, giúp làm giảm đau rát, khó chịu, dịu vùng da bị sưng, viêm đỏ rát, chảy máu ngay tại vùng hậu môn.

Thành phần:

Lidocain, Hydrocortison acetat, Zinc oxyd, Isopropyl Methylphenol, Clorpheniramin maleat, Allantoin, Tocopheryl acetat

Quy cách đóng gói:

Hộp 1, 2, 3, 4 vỉ x 6 viên.

Hộp 1, 2, 3, 4 vỉ x 7 viên.

Hộp 1, 2, 3, 4 vỉ x 10 viên

Chỉ định:

Giảm triệu chứng của bệnh trĩ, đau, ngứa, sưng và chảy máu hậu môn.

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Không sử dụng trong khi mang thai hoặc cho con bú.

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 1-3 viên/ngày. Đợt điều trị không quá 7 ngày.

Cách dùng:

Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn bằng nước ấm hoặc nước muối loãng. Sau đó lau khô nhẹ nhàng. Dùng tay đẩy viên đạn theo hướng đi của viên đạn vào sâu trong hậu môn từ 2-3cm sao cho tay bạn không chạm đến viên thuốc.

Thận trọng và cảnh báo:

Bệnh nhân bị chảy máu trực tràng hoặc máu trong phân nên nói chuyện với bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này vì những tình trạng này có thể là triệu chứng của rối loạn nghiêm trọng hơn. Như với tất cả các sản phẩm có chứa steroid tại chỗ, khả năng hấp thụ toàn thân nên được lưu ý. Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện, bệnh nhân nên được hướng dẫn ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không lái xe hoặc vận hành xe hoặc máy móc sau khi sử dụng (buồn ngủ có thể xảy ra)

Không sử dụng trong một thời gian dài

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI.
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

VNP LADA

Hỗ trợ giảm

SUPP

Đau - Ngứa rát - Khó chịu do trĩ

VIÊN ĐẠN PHỐI HỢP 7 THÀNH PHẦN
GIÚP GIẢM ĐAU VIÊM LẬP TỨC CHO NGƯỜI BỊ TRĨ



Giới thiệu:

VNP Lada supp là viên đạn phổi hợp nhiều thành phần bao gồm các tác nhân chống viêm, chống dị ứng, làm dịu vết thương, giảm đau rát, khó chịu nhằm giúp giảm các triệu chứng cấp của bệnh trĩ như sưng, viêm, đỏ rát, chảy máu ngay tại vùng hậu môn.

Thành phần:

Lidocain, Hydrocortisol acetate, Kẽm oxyd, Isopropyl methylphenol, Clorpheniramin maleat, allantoin, tocopheryl acetate.

Tá dược: tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định:

Giảm triệu chứng của bệnh trĩ, đau, ngứa, sưng và chảy máu hậu môn.

Liều lượng và cách dùng:

Liều dùng: 1-3 viên/ ngày. Đợt điều trị không quá 7 ngày.

Cách dùng: vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn bằng nước ấm hoặc nước muối loãng. Sau đó lau khô nhẹ nhàng.

Dùng tay đẩy viên đạn theo hướng đi của viên đạn vào sâu trong hạch mòn từ 2-3 cm sao cho tay không chạm tới viên đạn.

Không sử dụng sản phẩm liên tục quá 7 ngày.

Lưu ý sử dụng:

KHÔNG SỬ DỤNG cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Viên đạn có thể bảo quản trong điều kiện thường. Trước khi sử dụng cho vào ngăn mát tủ lạnh (2-8 độ C) 10 phút cho dù ở cung.

Bóc viên ra phải sử dụng lập tức vì rời lớp vỏ, viên dễ tan nhanh.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Số PTN: 190001296/PCBA-HN