

ZINOBABY

THÀNH PHẦN:

- Kẽm gluconat 70 mg (tương đương 10 mg kẽm)
- Tá dược: Lactose, aspartam, vàng tartrazin, sunset yellow, bột mùi cam vừa đủ 1 gói.

DẠNG BẢO CHẾ: Cốm pha hỗn dịch uống.

CHỈ ĐỊNH :

- Phòng ngừa và điều trị thiếu kẽm trong những trường hợp ăn uống thiếu kẽm, kém hấp thu kẽm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Tránh dùng kẽm trong giai đoạn loét dạ dày tá tràng tiến triển, nôn ói cấp tính.
- Dùng kẽm lâu dài liều cao bằng đường uống dẫn đến thiếu hụt đồng, bệnh thiếu máu do thiếu sắt và giảm bạch cầu trung tính.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Bổ sung nhu cầu hằng ngày theo chỉ định của bác sĩ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Tác dụng không mong muốn hay xảy ra nhất với các muối kẽm khi dùng đường uống liên quan đến dạ dày ruột bao gồm đau bụng, khô tiêu, tình trạng buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, kích thích dạ dày và viêm dạ dày. Những tác dụng phụ này rõ ràng hơn nếu uống lúc dạ dày rỗng và giảm đi khi dùng vào các bữa ăn.

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Sự hấp thu kẽm có thể giảm bởi penicillamin, tetracyclin và các chế phẩm có chứa sắt, phospho. Việc bổ sung kẽm làm giảm hấp thu đồng, sắt, kháng sinh nhóm quinolon, penicillamin và tetracyclin.
- Tránh dùng chung thuốc với các chế phẩm có chứa calci, biphosphonat.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Bổ sung kẽm: mỗi lần uống từ 1/3 gói đến 1 gói, ngày dùng 1 đến 2 lần, tùy từng trường hợp.
- Điều trị thiếu kẽm: Mỗi lần uống 1 gói, ngày dùng 2 lần, uống trước bữa ăn. Nên giảm liều khi triệu chứng lâm sàng đã được cải thiện.

Liều dùng cụ thể theo tuổi cho kẽm nguyên tố như sau:

- + Trẻ em từ 4-8 tuổi: 5 mg (tương đương 35 mg kẽm gluconat)
- + Từ 9-13 tuổi: 8 mg (tương đương 56 mg kẽm gluconat)
- + Từ 14-18 tuổi: 11 mg (tương đương 77 mg kẽm gluconat)
- + Từ 19 tuổi trở lên: 11 mg (tương đương 77 mg kẽm gluconat)

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Quá liều cấp tính các muối kẽm gây loét dạ dày do hình thành muối kẽm clorid bởi acid dạ dày.
- Xử trí: Chỉ định muối kiềm carbonat, uống sữa hoặc than hoạt tính. Không nên dùng chất gây nôn hoặc thụt rửa dạ dày.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp chứa 30 gói x 1 g.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.



MEYER-BPC

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC

Số 6A3 quốc lộ 60 p.Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre-Việt Nam